ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ИФЕНЕК
(IFENEC)

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Ифенек.
Международное непатентованное название: эконазол.
Лекарственная форма: порошок для наружного применения.
СОСТАВ: 100 г порошка содержат:
Активное вещество: эконазола нитрат - 1,0 г.
Вспомогательные вещества: тальк, цинка оксид, кремния диоксид коллоидный.
Описание: белый мелкий порошок без запаха.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Противогрибковое средство.
Код АТХ D01AC03.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Эконазол – синтетическое производное имидазола. Оказывает местное противогрибковое и антибактериальное действие. Тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Легко растворяется в липидах и хорошо проникает в ткани. Активен в отношении дерматофитов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, дрожжеподобных грибов рода Candida , а также Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare), вызывающего разноцветный лишай и Corinebacterium minutissimum, некоторых грамположительных бактерий (стрептококки, стафилококки).

Фармакокинетика
При нанесении на кожу системная абсорбция незначительна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Грибковые поражения кожи и волосистой части головы, разноцветный лишай, эритразма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ
Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Наружно. Только для взрослых. Порошок наносят на поражённые участки кожи и слегка втирают. Процедуру проводят 1 раз в день при микозе стоп, кистей и туловища; разноцветном лишае и эритразме - 2 раза в день (утром и вечером).
Длительность терапии индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного выздоровления не следует прекращать лечение кремом сразу же после исчезновения острых симптомов воспаления или субъективных жалоб. Длительность терапии должна составлять, в среднем, около 4 недель.

Разноцветный лишай излечивается, в основном, в течение 1-3 недель, эритразма в течение 2-4 недель, а дерматомикозы в течение 4 недель. При лечении высококератизированных участков кожи (стоп) – до 1,5 месяцев.
Для предотвращения рецидива микоза стоп после разрешения клинических проявлений лечение следует продолжить еще в течение 2 недель.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Обычно Ифенек переносится хорошо, даже в случае чувствительной кожи. В редких случаях возможно раздражение, ощущение жжения и зуда, покраснение кожи, сыпь. При длительном применении – гиперпигментация и атрофические изменения кожи. Если после применения препарата возникнут побочные эффекты, которые не указаны в данной информации, то о них следует сообщить врачу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Клинические испытания и применение препарата в медицинской практике не выявили несовместимости или взаимодействия с другими лекарствами. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Только для наружного применения. При отсутствии эффекта в указанные сроки терапии следует прекратить лечение и пересмотреть диагноз. При появлении первых симптомов, свидетельствующих о повышенной чувствительности или раздражении, препарат необходимо отменить. Следует избегать попадания препарата в глаза.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок для наружного применения 1%. По 30 г препарата во флакон из полиэтилена белого цвета, закрытый белой полиэтиленовой крышечкой и колпачком. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Италфармако С.п.А., Италия
20126, Милан, Вьяле Фульвио Тести, 330.

Претензии по качеству препарата принимает
Представительство АО "Италфармако", г. Москва
119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 12.

И.о. директор ИЭКЭЛС А.Н.Васильев

Глава Представительства
АО "Италфармако" Л.И.Никова