ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ИФЕНЕК
(IFENEC)

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Ифенек.
Международное непатентованное название: Эконазол.
Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.
СОСТАВ: 1 суппозиторий вагинальный содержит:
Активное вещество: эконазола нитрат - 150,0 мг.
Вспомогательные вещества: полусинтетические глицериды (Новата ИВ Б, Миритол 318).
Описание: суппозитории торпедообразной формы от белого до желто-белого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА
Противогрибковое средство.
Код АТХ G01AF05.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Эконазол – синтетическое производное имидазола. Оказывает местное противогрибковое и антибактериальное действие. Тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Легко растворяется в липидах и хорошо проникает в ткани. Активен в отношении дерматофитов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, дрожжеподобных грибов рода Candida, плесневых грибов, а также Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare), вызывающего разноцветный лишай и Corinebacterium minutissimum; некоторых грамположительных бактерий (стрептококки, стафилококки).
Фармакокинетика
Эконазола нитрат слабо абсорбируется после введения во влагалище.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Вульво-вагинальные микозы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ
Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Только для взрослых. Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х дней.
В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения вагинального кандидоза возможно его увеличение до 6 дней и проведение повторного курса через 10 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
При применении Ифенека в редких случаях возможно раздражение, покраснение слизистой влагалища и вульвы, зуд и жжение в этих областях. Если после применения

препарата возникнут побочные эффекты, которые не указаны в данной информации, то о них следует сообщить врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
До настоящего времени сведений о передозировке не имеется.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Клинические испытания и применение препарата в медицинской практике не выявили несовместимости или взаимодействия с другими лекарствами. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Во время менструации препарат вводят интравагинально по обычной схеме.
При вульво-вагинальных микозах обязательно лечение и полового партнера.
Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

ФОРМА ВЫПУСКА
Суппозитории вагинальные по 150 мг.
По 6 суппозиториев в стрип из ПВХ.
Один стрип вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

СРОК ГОДНОСТИ
2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Ламп С.Просперо С.п.А., Италия.
Сан Просперо, (МО), ул. Дела Паче, 25/А.

Фирма-держатель разрешения на торговлю:
Италфармако С.п.А., Италия.
20126, Милан, Вьяле Фульвио Тести, 330.

Претензии по качеству препарата принимает
Представительство АО “Италфармако”, г. Москва
119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 12.

И.о. директора ИЛЭКСПЕРТ А.Н.Васильев

Глава Представительства
АО “Италфармако” Л.И.Никова