

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭКОДАКС®

наименование лекарственного препарата

крем для наружного применения 1%

лекарственная форма, дозировка

**«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы "Дж. Б. Кемикалс энд
Фармасьютикалс Лтд."), Индия**

наименование производителя, страна


Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 10 0 7 1 2 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакодинамика Эконазол - производное имидазола, противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения. Оказывает фунгицидное и бактерицидное действие. Тормозит синтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых и плесневых грибов: <i>Trichophyton rubrum</i>, <i>Trichophyton mentagrophytes</i>, <i>Trichophyton tonsurans</i>, <i>Microsporum canis</i>, <i>Microsporum audouini</i>, <i>Microsporum gypseum</i>, <i>Candida albicans</i>, <i>Torulopsis</i>, <i>Rhodotorula</i>, <i>Malassezia</i>	Фармакодинамика Эконазол - производное имидазола, противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения. Оказывает фунгицидное и бактерицидное действие. Тормозит синтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых и плесневых грибов: <i>Trichophyton rubrum</i>, <i>Trichophyton mentagrophytes</i>, <i>Trichophyton tonsurans</i>, <i>Microsporum canis</i>, <i>Microsporum audouini</i>, <i>Microsporum gypseum</i>, <i>Candida</i>

Старая редакция	Новая редакция
<i>furfur</i> (<i>Pityrosporum orbiculare</i>), вызывающего отрубевидный лишай, <i>Corynebacterium</i>, <i>Epidermophyton floccosum</i>, <i>Aspergillus</i>, <i>Cladosporium</i>, <i>Scopulariopsis brevicautus</i> и некоторых грамположительных бактерий (стрептококков, стафилококков и <i>Nocardia minutissima</i>). Эффективен в отношении грибов, устойчивых к лечению другими лекарственными средствами. При местном применении вызывает гибель грибов в течение 3 дней, способствует быстрой регрессии жжения и зуда кожных покровов. Показания для применения • Дерматомикозы кожи, волосистой части головы, вызванные дерматофитами, дрожжами, плесневыми грибами, в том числе - осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями. • Эритезма. • Разноцветный лишай. • Кожные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами.	<i>albicans</i>, <i>Torulopsis</i>, <i>Rhodotorula</i>, <i>Malassezia furfur</i> (<i>Pityrosporum orbiculare</i>), вызывающего отрубевидный лишай, <i>Corynebacterium</i>, <i>Epidermophyton floccosum</i>, <i>Aspergillus</i>, <i>Cladosporium</i>, <i>Scopulariopsis brevicautus</i> и некоторых грамположительных бактерий (стрептококков, стафилококков и <i>Nocardia minutissima</i>). Эффективен в отношении грибов, устойчивых к лечению другими лекарственными средствами. При местном применении вызывает гибель грибов в течение 3 дней, способствует быстрой регрессии жжения и зуда кожных покровов. Показания для применения • Дерматомикозы кожи волосистой части головы, вызванные дерматофитами, дрожжами, плесневыми грибами, в том числе - осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями. • Эритезма. • Разноцветный лишай. • Кожные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами.

Специалист по регистрации



Чумакова Л.И.