ИНСТРУКЦИЯ
(информация для специалистов)
по медицинскому применению препарата
Теоксим, ^{99m}Tc

Регистрационный номер

Торговое название
Теоксим, ^{99m} Tc

Международное непатентованное название
Эксаметазим.

Лекарственная форма
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Состав

Лиофилизат:

Активные вещества:	
Вспомогательные вещества:	
d,l-гексаметилпропиленаминоксима (Эксаметазима)	0,5 мг
Олова дихлорида безводного	5,1 мкг
Винной кислоты	15,0 мкг
Натрия хлорида	4,5 мг
Маннита (Маннитола)	5,0 мг

- 1 флакон

Готовый препарат:

Активные вещества:	
Технеций –99m	37 - 148 МБк
Вспомогательные вещества:	
d,l-гексаметилпропиленаминоксима (Эксаметазима)	0,1 мг
Олова дихлорида безводного	1,0 мкг
Винной кислоты	3,0 мкг
Натрия хлорида	9,9 мг
Маннита (Маннитола)	1,0 мг
Воды для инъекций	q.s.

- 1 мл

Описание

Лиофилизат - белого цвета.

Готовый препарат - бесцветная, прозрачная жидкость.

Физико-химические свойства

«Теоксим, ^{99m} Тс» - радиофармацевтический препарат готовится из лиофилизата и раствора натрия пертехнетата, ^{99m}Тс из генератора технеция-99m.

Изотоп ^{99m}Тс имеет период полураспада 6,04 ч. При распаде ^{99m} Тс испускает гамма-кванты с энергией 140 КэВ и выходом 90 %.

Фармакотерапевтическая группа

Радиофармацевтическое диагностическое средство.

Код АТХ V09AA01

Фармакологические свойства

Диагностическое средство для оценки церебрального кровотока и приготовления in vitro меченных ^{99m}Тс лейкоцитов.

Свойство Теоксима, ^{99m}Тс накапливаться в тканях головного мозга в зависимости от состояния мозгового кровотока позволяет с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) выявлять заболевания головного мозга, связанные с нарушением васкуляризации.

Известная тропность Теоксима, ^{99m}Тс к лейкоцитам используется для введения метки в форменные элементы крови. В свою очередь, меченые ^{99m}Тс аутологичные лейкоциты позволяют использовать их для визуализации очагов воспаления различной локализации, в связи с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией очагов поражения.

Фармакокинетика

Уже с первых минут после внутривенного введения и в течение первого часа отмечается быстрый переход препарата из кровеносного русла в ткани головного мозга, где Теоксим, ^{99m}Тс прочно связывается со специфическими протеинами и другими биоструктурами ткани мозга. Препарат хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер и накапливается в головном мозге пропорционально уровню мозгового кровотока, стабильный уровень концентрации препарата сохраняется достаточно долго.

Уровень накопления Теоксима, ^{99m}Тс в головном мозге составляет 3,5-4,5% от введенной активности. Только через 2 часа появляются первые признаки медленного выведения изотопа из крови с периодом полувыведения 16 часов. Так через 24 часа он составляет более 70% от максимального значения.

Обладая липофильными свойствами, лимитирующими прохождение комплекса через гломерулярную систему почек, Теоксим, ^{99m}Тс выводится из организма гепатобилиарной системой с периодом полувыведения 24 часа.

Появление технеция-99м в моче в течение второго часа после введения препарата обусловлено присутствием второго комплекса, не обладающего энцефалотропностью, но и не влияющего на стабильное содержание за этот период основного липофильного комплекса в мозговой ткани.

Показания к применению

Для диагностики заболеваний головного мозга, связанных с нарушением церебрального кровообращения: при транзиторной ишемии головного мозга, инсульте, эпилепсии, мигрени, деменции, опухолях.

Для визуализации очагов воспаления различной локализации и происхождения методом введения меченых препаратом Теоксим, ^{99m}Tc in vitro лейкоцитов и гранулоцитов.

Противопоказания

Беременность, гиперчувствительность к препарату, возраст до 18 лет.

Применение при лактации

При необходимости введения препарата в период лактации следует прекратить кормление ребенка грудью в течение 24 ч после исследования.

Способы применения и дозы

Вводят внутривенно.

Для исследования кровообращения головного мозга.

Приготовление препарата.

Препарат приготавливают непосредственно перед использованием путем добавления 5,0 мл натрия пертехнетата, ^{99m}Tc из генератора технеция-99м во флакон с лиофилизатом. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

- Раствор натрия пертехнетата, ^{99m}Tc должен быть получен не позднее, чем через 24 часа после предыдущего элюирования генератора технеция-99м.
- Полученный раствор натрия пертехнетата, ^{99m}Tc должен быть использован для приготовления препарата Теоксим, ^{99m}Tc в течение 2 часов. Готовый препарат может храниться не более 30 минут.

После добавления элюата из генератора технеция и тщательного перемешивания содержимое флакона вводится внутривенно.

Вводимая доза: 0,5мг d,l-ГМПАО изомера, меченного 185-740 МБк технеция-99м. Для оценки используют ОФЭКТ. Плоскостную томографию проводят в четырех проекциях. ОФЭКТ проводится по известной методике через 10-15 мин. после введения препарата.

Выявление очагов воспаления.

Приготовление меченых лейкоцитов:

Необходимые реактивы:

1. Декстрозы цитрат (ДЦ):
   - натрия цитрат – 22 г
   - лимонной кислоты – 8 г
   - декстрана 500 – 22,4 г
   - воды для инъекций – до 1 л

Раствор стерилизуют через миллипоровый фильтр (0,2 μ).

2. 2% раствор метилцеллюлозы в физиологическом растворе, для чего растворить 2 г Methocell E50 Premium (Dow) в 100 мл стерильного апирогенного физиологического раствора, перемешать до полного растворения. Раствор профильтровать через фильтр 0,45 μ. Раствор хранить при температуре 2-4^{0}C.

Необходимое оборудование:

- Пластиковый негепаринизированный шприц объемом 60 мл – 2 шт.
- Пластиковые центрифужные пробирки с крышечками стерильные вместимостью 25 – 30 мл (далее центрифужные пробирки) – 7 шт.

Процедуру выделения и мечения лейкоцитов проводят в условиях стерильности, для чего необходимо:

- Внести по 9 мл ДЦ в каждый из 2-х 60 мл пластиковых негепаринизированных шприцев.
- Отобрать по 51 мл крови пациента в каждый шприц, используя иглу 19G (бабочка). Закрыть шприцы стерильными пробками. Осторожно перемешать кровь и ДЦ.
- Внести по 2 мл 2% раствора метилцеллюлозы в каждую из 4 центрифужных пробирок.
- Внести из шприцев без иглы по 20 мл крови в 4 подготовленные центрифужные пробирки, осторожно перемешать и закрыть крышечками. Оставить для седиментации эритроцитов на 1 час при комнатной температуре.
- Оставшиеся 20 мл крови внести в чистую центрифужную пробирку. Центрифугировать пробирку с кровью 10 мин. при 2000g. Полученную чистую плазму использовать для мечения и инъекции. Плазму хранить при комнатной температуре. На пробирку нанести метку «А».
- По окончании седиментации эритроцитов, осторожно перенести богатый тромбоцитами и лейкоцитами супернатант в чистую центрифужную пробирку. Центрифугировать 5 мин. при 150g. В полученном осадке находятся лейкоциты.
- Удалить как можно больше плазмы в чистую центрифужную пробирку и центрифугировать 10 мин. при 2000g , чтобы получить плазму, содержащую метилцеллюлозу. Эту плазму использовать для отмывания клеток после мечения. На пробирку нанести метку «Б».
- Ресуспендировать осадок лейкоцитов путем легкого встряхивания пробирки. Внести 1 мл чистой плазмы из пробирки «А».
- Определить жизнеспособность выделенных лейкоцитов при помощи прижизненной окраски с трипановым синим. Для мечения пригоден лейкоконцентрат, содержащий не менее 90% жизнеспособных клеток.
- В стандартный флакон реагента добавить 340 – 550 МБк пертехнетата в объеме 2-3 мл и тщательно перемешать в течение 3 мин. При этом необходимо соблюдать следующее:
- раствор натрия пертехнетата, ^{99m}Tc должен быть получен не позднее, чем через 24 часа после предыдущего элюирования генератора технеция-99м
- полученный раствор натрия пертехнетата, ^{99m}Tc должен быть использован для приготовления препарата Теоксим, ^{99m}Tc в течение 2 часов. Готовый препарат может храниться не более 30 мин.
- Готовый препарат добавить к взвеси клеток и инкубировать при комнатной температуре в течение 10 мин. По окончании инкубации свободный ГМПАО, ^{99m}Tc блокировать добавлением 10 мл плазмы из пробирки «Б». Центрифугировать в течение 5 мин. при 150g.
- Удалить весь супернатант, осторожно ресуспендировать меченые лейкоциты в 5 мл плазмы из пробирки «А». Полученный препарат готов к внутривенному введению пациенту и должен быть использован непосредственно после приготовления.

Диагностика очагов воспаления:

Вводимая внутривенно активность составляет 370 – 450 МБк. Исследование проводится через 1 час и 4 часа после введения. Полученные сцинтиграммы оцениваются визуально.

Лучевые нагрузки на органы и все тело пациента при использовании препарата Теоксим, ^{99m}Tc

Органы и системы	Поглощенная доза, мГр/МБк	
	При проведении оценки состояния перфузии головного мозга	После внутривенного введения меченых лейкоцитов
Слезные железы	0,069	-
Желчный пузырь	0,055	-
Селезенка	-	0,157
Почки	0,037	-
Щитовидная железа	0,030	-
Верхний отдел толстой кишки	0,027	-
Печень	0,018	0,024
Красный костный мозг	-	0,005
Тонкий кишечник	0,016	-
Нижний отдел толстой кишки	0,012	-
Мочевой пузырь	0,011	0,006
Головной мозг	0,008	-
Яичники	0,006	0,004
Семенники	0,001	-
Эффективная эквивалентная доза, мЗв/МБк	0,0178	0,0165

Побочные действия

Каких-либо побочных действий при применении препарата в диагностических целях не выявлено. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При однократном введении передозировка маловероятна, в связи с отсутствием у препарата фармакодинамических свойств.

Взаимодействие с другими препаратами

При проведении диагностических исследований взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечалось.

Особые указания

Работа с препаратом должна проводиться в соответствии с «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99), «Нормами радиационной безопасности» (НРБ–99) и методическими указаниями «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов» (МУ 2.6.1.1892-04)

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (флаконы 10 мл). По 5 флаконов вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в коробке из картона.

Условия хранения

Лиофилизат хранят при температуре от 2 ^{0}C до 10 ^{0}C. Допускается отклонение от температурного режима (18-25^{o}C) при транспортировании в течение 1 мес.

Готовый препарат хранят в соответствии с «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99).

Срок годности

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения – 1 год с даты изготовления.

Препарат Теоксим , ^{99m}Tc - 30 минут с момента приготовления.

Условия отпуска

Препарат отпускается только по заявкам в специализированные лечебно-диагностические учреждения.

Производитель

ООО "Диамед",
123182, г. Москва,
ул. Живописная, д.46,
Тел. (499) 190 95 05
Тел./факс (499) 190 58 32

Директор ООО «Диамед» Т.И.Тульская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАМЕД» г. МОСКВА

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ФГУ НЦЭСМП