

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ

Регистрационный номер

Торговое наименование

Элеутерококка экстракт жидкий

Международное непатентованное или группировочное наименование

Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт

Лекарственная форма

Экстракт для приема внутрь

1 мл препарата содержит:

Элеутерококка колючего корневищ и корней	- 1,0 г
Этанола (спирта этилового) 40 %	- достаточное количество до получения 1 мл

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, характерного запаха. При хранении возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующие средства.

Код АТХ A13A

Фармакологические свойства

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему (ЦНС), тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма, способствует улучшению аппетита, повышению физической и умственной работоспособности.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет при умственном и физическом переутомлении, астеническом состоянии различной этиологии, неврастении, артериальной гипотензии (пониженное артериальное давление), в период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

Противопоказания

- гиперчувствительность к элеутерококка колючего корневищам и корням или к любому из вспомогательных веществ;
- детский возраст до 12 лет;
- артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление);
- нарушение сердечного ритма;
- инфаркт миокарда;
- церебрально-сосудистая патология;
- повышенная возбудимость;

- эпилепсия;
- бессонница;
- острые инфекционные заболевания;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- хронические заболевания печени.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет, пациенты со склонностью к развитию лекарственной зависимости, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь до еды в первой половине дня. Взрослым назначают по 20-30 капель, разведенных в $\frac{1}{4}$ стакана воды, 2-3 раза в день. Детям старше 12 лет – в дозе из расчета по 1 капле на год жизни. Курс лечения – 25-30 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические реакции, тахикардия, головная боль, бессонница, гипогликемия.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает действие стимуляторов ЦНС и аналептиков (в т.ч. кофеина, камфоры, фенамина), является физиологическим антагонистом средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, анксиолитиков, противоэпилептических лекарственных средств).

При одновременном применении с дигоксином возможно повышение концентрации в плазме крови последнего; с гипогликемическими лекарственными средствами (в т.ч. инсулин) и антикоагулянтами возможно усиление эффекта.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Элеутерококка экстракт жидкий проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание бессонницы. При явлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат.

Максимальная разовая доза препарата (30 капель) содержит 0,43 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата (90 капель) – 1,4 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь. По 50 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками/пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке картонной) для защиты от света при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ДАНСОН-РУ»

Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1, ком.220

Тел.: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Россия, 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Тел.: (4852) 44-38-56

e-mail: farm_info@yarff.ru

Директор АО «ЯФФ»



Юдина Е.В.