МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-002484/07-250814
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ

Регистрационное удостоверение: ЛСР-002484/07

Торговое наименование препарата: Элеутерококка экстракт жидкий

Лекарственная форма: экстракт для приема внутрь [жидкий]

Состав

Для получения экстракта используют:

Активное вещество:

Корневище и корень элеутерококка колючего - 1000 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (этиловый спирт) 40 % - до получения 1000 мл экстракта

Описание

Жидкость тёмно-коричневого цвета с возможной лёгкой опалесценцией и своеобразным запахом. При хранении возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ A13A

Фармакологическое действие

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма, способствует улучшению аппетита, повышению физической и умственной работоспособности.

Показания к применению

Умственное и физическое переутомление, астенические состояния различной этиологии, артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), неврастения, период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечного ритма, инфаркт миокарда, церебрально-сосудистая патология, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст от 12 лет.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь, до еды, в первой половине дня. Взрослым назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день. Детям старше 12 лет - в дозе из расчёта по 1 капле на год жизни. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Перед употреблением взбалтывать.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, бессонница, гипогликемия, головная боль, тахикардия.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает действие стимуляторов центральной нервной системы, является антагонистом лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, анксиолитиков, противоэпилептических лекарственных средств).

При одновременном применении с дигоксином возможно повышение концентрации в плазме крови последнего; с гипогликемическими лекарственными средствами (в т.ч. инсулин) и антикоагулянтами возможно усиление эффекта.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушений сна. При явлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат.

Максимальная разовая доза препарата (30 капель) содержит 0,47 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата (90 капель)–1,41 г абсолютного этилового спирта.

В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь [жидкий].

По 25 и 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла или во флаконы

оранжевого стекла или во флаконы с винтовой горловиной коричневого стекла, укупоренные пробками-капельницами полимерными или пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми, или крышками с капельницей.

Каждый флакон-капельницу или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Упаковка для стационаров.

По 4, 9 или 17 кг в канистры полиэтиленовые с крышками.

По 17 кг в бутыли стеклянные, укупоренные крышками полимерными навинчиваемыми с прокладками из полиэтилена. Каждую бутыль помещают в барабан полиэтиленовый для стеклянных бутылей.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»

Россия, 125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1

тел. (495) 956-05-71, факс (495) 459-41-12

www.mosfarma.ru

Генеральный директор
ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» М.Д. Дулькис