ИНСТРУКЦИЯ

ЛСР-010223/08-191208

по медицинскому применению препарата

ГЕМАПАКСАН

раствор для подкожного введения 10000 анти-Ха МЕ/мл

(в шприцах по 2000 МЕ/0,2 мл, 4000 МЕ/0,4 мл, 6000 МЕ/0,6 мл),

Италфармако С.п.А., Италия

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Срок введения Изменений с «13» 11 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное название: эноксапарин.	**Международное непатентованное название:** эноксапарин натрия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ **Особые категории пациентов** • Пациенты пожилого возраста: не требуется коррекция дозы, если только не нарушена функция почек. • При выраженной почечной недостаточности дозу корректируют в зависимости от величины клиренса креатинина: при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин профилактическая	**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ** **Особые категории пациентов** • Пациенты пожилого возраста: не требуется коррекция дозы, если только не нарушена функция почек. • При выраженной почечной недостаточности дозу корректируют в зависимости от величины клиренса креатинина: при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин профилактическая

Старая редакция	Новая редакция
доза составляет 2000 МЕ/кг массы тела 1 раз в сутки; терапевтическая доза - 100 МЕ/кг массы тела 1 раз в сутки. • При легкой и умеренной почечной недостаточности: коррекции дозы не требуется.	доза составляет 2000 МЕ 1 раз в сутки; терапевтическая доза - 100 МЕ/кг массы тела 1 раз в сутки. • При легкой и умеренной почечной недостаточности: коррекции дозы не требуется.

Глава Представительства
АО «Италфармако» _____ Л.И.Н[illegible]ова

«10» [illegible] 2009 г