МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000774- 170113
СОГЛАСОВАНО

ЭПИРУБИЦИН

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 2 мг/мл

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», Украина

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 17 01 13 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 10 мг/5 мл, 50 мг/25 мл, 100 мг/50 мл (2 мг/мл). По 5 мл во флаконы из трубки стеклянной или по 5 мл, по 25 мл или по 50 мл во флаконы из стекла, укупоренные пробками резиновыми с алюминиевыми колпачками. По 10 флаконов по 5 мл или по 1 флакону по 5 мл, по 25 мл или по 50 мл вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.	**Форма выпуска** Концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 10 мг/5 мл, 50 мг/25 мл, 100 мг/50 мл (2 мг/мл). По 5 мл во флаконы из трубки стеклянной или по 5 мл, по 25 мл, по 50 мл во флаконы из стекла 1-го гидролитического класса, укупоренные пробками резиновыми с алюминиевыми колпачками или с колпачками комбинированными из алюминия и пластмассы. По 10 флаконов по 5 мл или по 1 флакону по 5 мл, по 25 мл, по 50 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается упаковка в пленку по 10 пачек с одним флаконом по 5 мл или по 1 пачке с одним флаконом по 25 мл, по 50 мл.

Представитель
ОАО «Фармстандарт» С.В. Барыкин