МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N000525/01-290313
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭРИТРОСТИМ®
раствор для внутривенного и подкожного введения
500 МЕ, 2000 МЕ, 3000 МЕ, 4000 МЕ

ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России, Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 29 03 13 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ИНСТРУКЦИЯ** по применению лекарственного препарата для медицинского применения **ЭРИТРОСТИМ®**	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ИНСТРУКЦИЯ** по применению лекарственного препарата для медицинского применения **ЭПОЭТИН БЕТА**
Торговое наименование препарата: Эритростим®	**Торговое наименование препарата:** Эпоэтин бета
Беременность и период грудного вскармливания Достаточного опыта применения при беременности и в период грудного вскармливания нет. Во время беременности и в период грудного вскармливания Эритростим следует назначать только в том случае, когда возможные преимущества его применения превышают потенциальный риск.	**Беременность и период грудного вскармливания** Достаточного опыта применения при беременности и в период грудного вскармливания нет. Во время беременности и в период грудного вскармливания Эпоэтин бета следует назначать только в том случае, когда возможные преимущества его применения превышают потенциальный риск.
Передозировка Терапевтический индекс Эритростима очень широкий, однако, следует принимать во внимание индивидуальный ответ на терапию в начале лечения. Возможен	**Передозировка** Терапевтический индекс Эпоэтина бета очень широкий, однако, следует принимать во внимание индивидуальный ответ на терапию в начале лечения. Возможен

Старая редакция	Новая редакция
чрезмерный фармакодинамический ответ, т.е. чрезмерный эритропоэз с жизнеугрожающими сердечно-сосудистыми осложнениями. При высоком показателе Hb необходимо временно прервать терапию Эритростимом (см. «Способ применения и дозы»). При необходимости может быть проведена флеботомия. **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами** Опыт клинического применения Эритростима до настоящего времени не выявил фактов фармакологической несовместимости с другими лекарственными препаратами. Результаты экспериментальных исследований показали, что эритропоэтин не усиливает миелотоксическое действие таких цитостатиков, как циклофосфамид, фторурацил, этопозид и цисплатин. Во избежание возможной несовместимости или снижения активности Эритростим нельзя смешивать с растворами других лекарственных препаратов. **Производитель/организация, принимающая претензии:** ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15, тел. (495) 710-37-87. Адрес производства: Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15, тел. (495) 674-55-80. Россия, 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 105, тел. (347) 229-92-01.	чрезмерный фармакодинамический ответ, т.е. чрезмерный эритропоэз с жизнеугрожающими сердечно-сосудистыми осложнениями. При высоком показателе Hb необходимо временно прервать терапию Эпоэтином бета (см. «Способ применения и дозы»). При необходимости может быть проведена флеботомия. **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами** Опыт клинического применения Эпоэтина бета до настоящего времени не выявил фактов фармакологической несовместимости с другими лекарственными препаратами. Результаты экспериментальных исследований показали, что эритропоэтин не усиливает миелотоксическое действие таких цитостатиков, как циклофосфамид, фторурацил, этопозид и цисплатин. Во избежание возможной несовместимости или снижения активности Эпоэтин бета нельзя смешивать с растворами других лекарственных препаратов. **Производитель/организация, принимающая претензии:** ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15, тел. (495) 710-37-87. Адрес производства: Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д. 15, тел. (495) 674-55-80. Россия, 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новороссийская, д. 105, тел. (347) 229-92-01.

Генеральный директор
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России

В.Ф. Руденко