МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Медицинский антисептический раствор
наименование лекарственного препарата

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
40 %, 70 %, 90%
лекарственная форма, дозировка

ООО «БиоФармКомбинат», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 130813 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Производитель ООО «БиоФармКомбинат», Россия 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33. Тел: 8(498)4810570. **Производитель** ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 31 Тел/факс: **Организация, принимающая претензии** ООО «БиоФармКомбинат», Россия 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33. Тел: 8(498)4810570.	**Производитель** ООО «БиоФармКомбинат», Россия 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, пл. Победы, д. 1. Телефон: (4912) 428-606. **Производитель/Организация, принимающая претензии** ООО «БиоФармКомбинат», Россия 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, пл. Победы, д. 1. Телефон: (49130) 2-41-40; 2-23-67. факс (495) 645-23-03.
Форма выпуска Раствор для наружного применения и	**Форма выпуска** Раствор для наружного применения и

Старая редакция	Новая редакция
приготовления лекарственных форм 40 %, 70 %, 90 %. По 50, 100 мл во флаконы из стекломассы, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для производственных отделов аптек). По 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры (для производственных отделов аптек). По 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров).	приготовления лекарственных форм 40 %, 70 %, 90 %. По 50, 100 мл во флаконы из стекломассы, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. По 100 мл во флаконы полимерные с укупорочными средствами. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для производственных отделов аптек). По 40 флаконов в пачке с инструкцией по 100 мл или по 70 флаконов в пачке с инструкцией по 50 мл помещают в коробку из картона или ящик из картона. По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые

Старая редакция	Новая редакция
	канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению.

Генеральный директор

ООО «БиоФармКомбинат», А.А. Найденышев