МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Спирт этиловый

наименование лекарственного препарата

концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%

лекарственная форма, дозировка

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 04 05 16 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм. По 50, 100 мл во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона	Форма выпуска Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм. По 25, 50, 100 мл во флаконы стеклянные оранжевого или бесцветного стекла; укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. По 25, 50, 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата или во флаконы из полиэтилена высокой плотности с укупорочными средствами. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл с равным количеством инструкции

Старая редакция	Новая редакция
(для производственных отделов аптек). По 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры (для производственных отделов аптек). По 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров).	по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для производственных отделов аптек). По 40 флаконов в пачке с инструкцией по 100 мл или по 70 флаконов в пачке с инструкцией по 50 мл по 70 флаконов в пачке с инструкцией по 25 мл флаконов помещают в коробку из картона по ГОСТ 7933-89 или ящик из картона гофрированного по ГОСТ 7376-89. По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для производственных отделов аптек).
Хранение В хорошо укупоренной таре, вдали от источников огня, в защищенном от света месте при температуре от 12 до 15 ^{0}С.	**Хранение.** Хранить при температуре не выше 25 °С, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. В недоступном для детей месте.

Генеральный директор
ПХФК ОАО «Медхимпром» М.А. Шибаев