МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Спирт этиловый
наименование лекарственного препарата

Международное непатентованное название или группировочное название
Этанол

Лекарственная форма
Раствор для приготовления лекарственных форм

Описание
Прозрачная, бесцветная, подвижная жидкость с характерным спиртовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа
Антисептическое средство
Код АТХ
D08AX08

Фармакологические свойства
Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов).
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола.
Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

Показания к применению
Применяют в качестве антисептического и дезинфицирующего средства (обработка медицинского инструментария, рук хирурга и операционного поля).

Противопоказания
Гиперчувствительность.

С осторожностью
Беременность, период лактации, детский возраст.

Применение при беременности и лактации
При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы
95 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям. Для приготовления 70 % раствора берут 675 г спирта этилового и 325 г

воды очищенной, и перемешивают. Для приготовления 40 % раствора берут 360 г спирта этилового и 640 г воды очищенной, и перемешивают.
Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний, а так же в виде примочек (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.

Побочное действие
Аллергические реакции, ожоги кожи, покраснение и болезненность кожи в месте компресса.
При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение ЦНС).

Передозировка
При наружном применении передозировка неизвестна.

Особые указания
Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей.
Применение препарата согласно инструкции по медицинскому применению не оказывает отрицательного влияния на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Форма выпуска
Раствор для приготовления лекарственных форм 95 % по 50 мл во флакон оранжевого стекла, или по 100 мл во флакон или банку оранжевого стекла. Каждый флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Для стационаров: по 1 л, 5 л в полимерную бутылку. Бутылки по 1 л с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящик из гофрированного картона. Бутылки по 5 л с равным количеством инструкций по медицинскому применению упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку. По 5 л, 10 л, 20 л, 30 л в полимерную канистру из полиэтилена низкого давления. К канистре прилагается инструкция по медицинскому применению. Допускается нанесение текста инструкции по медицинскому применению на этикетку канистры и бутылки.

Условия хранения
При температуре от 12 до 15 ^{0}С, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня.
В недоступном для детей месте.

Срок годности
5 лет.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
Отпуск по рецепту.

Производитель:
ООО «РОСБИО»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12. Лит. «А».
Тел./факс: (812) 412-12-71
301150, Тульская обл., село Воскресенское, ул. Заводская, д. 1-а
412210, Саратовская обл., г. Аркадак, поселок Спиртзавода, д.5
174360, Новгородская обл., Окуловский район, Известковый сельсовет, д. Березовка, д.. 75

Производитель/организация, принимающая претензии:
ООО «РОСБИО», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12. Лит. «А».
Тел./факс: (812) 412-12-71

Представители фирмы:
Исполнительный директор
ООО «РОСБИО» Фахрутдинов А.М.