ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ

Регистрационный номер:

Торговое название: Этиловый спирт

Международное непатентованное или группировочное название: этанол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

Состав: смесь этанола с водой, содержащая по объему 95% этанола.

Описание: прозрачная бесцветная подвижная жидкость с характерным запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.
Код АТХ [D08AX08]

Фармакологическое действие
Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола.
Для обеззараживания кожи используют 70% раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95%, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.
Является растворителем для ряда ЛС, а также экстрагентом для ряда веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье.

Фармакокинетика
При наружном применении всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек в системный кровоток. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

Показания к применению
Лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного

поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к др. антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо).
Консервация биологического материала, изготовление лекарственных форм для наружного применения, настоек, экстрактов.

Противопоказания
Гиперчувствительность.

С осторожностью:
Беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы
Наружно, в виде примочек, компрессов и обтираний. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70% раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40% раствор.
95% раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.
ЛС, приготовленные на основе этанола, применяют в соответствии с инструкциями по медицинскому применению данных лекарственных форм.

Побочное действие
Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения компресса.
При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

Особые указания
Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в период лактации.

Форма выпуска
Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %.
По 50, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками.
По 100 мл во флаконы из оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми закатываемыми с прокладками.
Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается полный текст инструкции по медицинскому применению наносить на пачку.
По 64 флакона по 50 мл или по 30 флаконов по 100 мл без пачки помещают в коробку из картона гофрированного с равным количеством инструкций по применению или по 30 флаконов по 50 мл или по 20 флаконов по 100 мл без пачки в стопу из бумаги мешочной или оберточной (для стационаров).
По 10 или 21.5 л в полиэтиленовые канистры (для производственных отделов аптек).

Условия хранения
В хорошо укупоренной таре.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии:
ОАО «Фармацевтическая фабрика», 456600 Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 41, тел./факс (35139) 7-62-31.

Генеральный директор
ОАО «Фармацевтическая фабрика» Ю.А. Кадах

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

57903