

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Метапрот®

Капсулы 50 мг, 125 мг, 250 мг

ООО «АнвиЛаб», Россия

Производитель: ЗАО «Фармпроект», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 10 07 12 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутрь, после еды. Взрослым по 0,25 г 2 раза в день. При необходимости суточную дозу повышают до 0,75 г (0,5 г утром и 0,25 г – после обеда), а лицам с массой тела свыше 80 кг – до 1 г (по 0,5 г 2 раза в день). Курс лечения – 5 дней с 2-дневными перерывами между ними во избежание кумуляции препарата. Количество курсов зависит от эффекта и в среднем составляет 2-3 (реже 1 или 4-6) курсов. Для повышения работоспособности в экстремальных условиях препарат принимают за 40-60 мин до предстоящей деятельности в дозе 0,5-0,75 г. При продолжении работы повторный прием производят через 68 ч в дозе 0,25 г. Максимальная суточная доза – 1,5 г, а в последующие сутки 1 г.	Способ применения и дозы Внутрь, после еды. Взрослым по 250 мг (1 капсула по 250 мг или 2 капсулы по 125 мг) 2 раза в сутки. При необходимости суточную дозу повышают до 750 мг (500 мг утром и 250 мг после обеда), пациентам с массой тела свыше 80 кг – до 1000 мг (по 500 мг 2 раза в сутки). Курс лечения – 5 дней. В зависимости от эффекта терапии проводят в среднем 2-3 курса (реже 1 или 4-6), во избежание кумуляции препарата между курсами рекомендуется делать двухдневный перерыв. Для повышения работоспособности в экстремальных условиях препарат принимают за 40-60 мин до предстоящей деятельности в дозе 500-750 мг. При продолжении работы повторный прием препарата производят через 6-8 ч в дозе 250 мг. Максимальная суточная доза – 1500 мг, а в последующие сутки 1000 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Для поддержания высокого уровня работоспособности в течение длительного времени (несколько недель) и для активации адаптационных процессов препарат назначают по схеме: 5-дневные курсы приема с 2-дневными перерывами в дозе 0,25 г 2 раза в сутки.	

Заместитель генерального директора
по операциям ООО «АнвиЛаб»

 А.Н.Шибеева

