МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ТРАВА

(Echinaceae purpureae herba)

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000451- 270916
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер

Торговое наименование
Эхинацеи пурпурной трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование
Эхинацеи пурпурной трава.

Лекарственная форма
Трава измельченная.

Состав
Эхинацеи пурпурной трава

Характеристика
Трава эхинацеи пурпурной содержит полисахариды, эфирные масла, флавоноиды, оксикоричные кислоты, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание
Кусочки стеблей, листьев, цветочных корзинок, цветков и плодов различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Цвет зеленый с желтоватыми, малиновыми или пурпурными вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа
Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие
Настой травы эхинацеи пурпурной оказывает общеукрепляющее действие на организм: способствует повышению активности неспецифических факторов защиты организма; оказывает стимулирующее влияние на индуктивную и продуктивную фазы гуморального и клеточное звено иммунного ответа, повышает активность микрофагов; обладает противовоспалительным, стресс-протективным, анксиолитическим, антидепрессантными свойствами.

Показания к применению
В качестве общеукрепляющего средства в составе комплексной терапии для профилактики рецидивов и осложнений при респираторных вирусных инфекциях и других воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату и растениям семейства сложноцветных; прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (такие как туберкулез,

саркоидоз, коллагеноз, рассеянный склероз); иммунодефицит (СПИД или ВИЧ-инфекция) и иммуносупрессия (например, цитостатическая противоопухолевая терапия; трансплантация органов или костного мозга в анамнезе); заболевания крови (агранулоцитоз, лейкемия); аллергические заболевания (крапивница, атопический дерматит, бронхиальная астма); детский возраст до 12 лет; беременность и период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Около 5 г (1 столовая ложка) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.
Настой принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели.
Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка
До настоящего времени случаев передозировок не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Возможно одновременное применение с антибиотиками и другими антимикробными средствами. Препарат несовместим с иммуносупрессорами.

Особые указания
При ухудшении состояния или появления высокой температуры на фоне применения препарата, или сохранения симптомов заболевания более 10 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска
Трава измельченная. По 30 г, 50 г, 75 г, 100 г в пачку картонную с внутренним бумажным пакетом или с внутренним пакетом из полипропилена. Полный текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте.
Приготовленное водное извлечение - в темном прохладном месте не более 2-х суток.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска
Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:
ООО «Лек С+»
141400 Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, д.1, корп. 7.
Тел./факс (495) 351-54-56

Адрес производства:
142002, Московская обл., г. Домодедово, ул. Текстильщиков, КШФ.
Тел./факс (49679) 30-469

Генеральный директор
ООО «Лек С+» В. Н. Кузнецов