

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Эхинацеи настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: Эхинацеи
пурпурной травы настойка

Лекарственная форма: настойка

Состав:

Для получения настойки необходимо:

Эхинацеи пурпурной травы	- 200 г
Этанол (спирт этиловый) 40 %	- достаточное количество для получения 1000 мл настойки

Описание: Прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета. При хранении возможно помутнение и/или выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства: Оказывает иммуностимулирующее и
противовоспалительное действие.

Фармакокинетика: Данные отсутствуют.

Показания к применению: В комплексной терапии хронических, рецидивирующих
инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (ринит, фарингит,
ларингит, трахеит, бронхит).

Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также
к растениям семейства астровых (сложноцветных), прогрессирующие системные
заболевания (туберкулёз, лейкоз, рассеянный склероз), детский возраст до 12 лет,
беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью: Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма,
заболевания головного мозга, эпилепсия, детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:
Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного
вскармливания.

Способ применения и дозы: Препарат следует принимать внутрь взрослым и детям от 12 лет до 18 лет по 25-35 капель 3 раза в день до еды. Средняя продолжительность лечения 2-3 недели. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом. Перед применением взбалтывать. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие: Аллергические реакции (гиперемия, отек лица, снижение артериального давления).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка: При превышении рекомендованных доз или длительности применения настойки эхинацеи возможно развитие симптомов нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота), повышенное нервное возбуждение, расстройства сна, аллергические реакции.

В случае превышения дозировки следует прекратить применение препарата и принять немедленные меры симптоматической и поддерживающей терапии (в соответствии с клиническим состоянием больного).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно уменьшение эффективности препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Эхинацеи настойка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания: В максимальной суточной дозе препарата содержится до 0,8 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами:

В период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска: Настойка. По 25 мл, 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла или во флаконы-капельницы коричневого стекла, укупоренные пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой из полимерных материалов или укупоренные крышками из полимерных материалов.

По 25 мл, 50 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной или во флаконы коричневого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов или пробками полиэтиленовыми капельницами и крышками из полимерных материалов, или пробками и крышками из полимерных материалов, или полиэтиленовыми крышками.

По 25 мл, 50 мл во флаконы с винтовой горловиной из полиэтилентерефталата в комплекте с навинчиваемыми полиэтиленовыми крышками или колпачками полиэтиленовыми (с контролем первого вскрытия или без).

По 50 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми с перфорацией, с отрывным и неотрывным предохранительным кольцом.

На каждый флакон, флакон-капельницу, наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или этикетку самоклеящуюся.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную. Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска: Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1
тел.: 8-800-333-33-47

Производитель (все стадии производства)

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1.

Производитель (выпускающий контроль качества)

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1 а.

Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1, д. 1 а.

тел.: 8-800-333-33-47

ekolab-ook@ekolab.ru