МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ГЕКСАСПРЕЙ

Регистрационный номер:

Торговое название: ГЕКСАСПРЕЙ

Международное непатентованное название: Биклотимол

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав на 1 флакон (30 г):

Действующее вещество:

Биклотимол.....0,75 г

Вспомогательные вещества:

Бензиловый спирт.....0,5 г

Динатрия эдетат 0,0025г

Метилпарагидроксибензоат.....0,025 г

Аниса обыкновенного семян масло.....0,03 г

Аммония глицирризинат.....0,02 г

Натрия сахаринат.....0,05 г

Авицел RC 591 (Целлюлоза микрокристаллическая

и кармеллоза натрия) .....0,3 г

Лецитин соевый .....0,9 г

Глицерол .....1,0 г

Этанол 96 % .....1,06 г

Вода..... ..... до 30,0 г

Описание

Однородная белого с желтоватым оттенком цвета суспензия с характерным запахом аниса

Код АТХ: R02AA20, A01AB11

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство.

Фармакологические свойства

Оказывает противомикробное действие (активен в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp.). Механизм действия обусловлен коагулиряцией белков микробной клетки. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие.

Фармакокинетические свойства

Медленно всасывается через слизистую оболочку полости рта, оказывает длительное местное действие.

Показания для применения

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта (включая стоматиты, гингивиты), глотки, гортани, вызванные чувствительными к биклотимолу возбудителями.

Местное лечение воспалительных и инфекционных заболеваний носоглотки и дыхательных путей (острый и хронический фарингит, фаринголарингит, тонзиллит, состояния после тонзиллэктомии, глоссит).

Противопоказания для применения

Детский возраст до 6 лет.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы.

Местно: по 2 дозы аэрозоля 3 раза в день независимо от приема пищи.

Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней. При необходимости продолжения лечения на больший срок необходима консультация врача.

Меры предосторожности при применении

Не применимо

Передозировка

Нет данных о случаях передозировки.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции.

В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Избегать одновременного применения других местных средств.

Особые указания

Во время ингаляции флакон держать вертикально.

Перед применением флакон взболтать.



Беременность и грудное вскармливание

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата в периоды беременности и лактации не проводилось.

При беременности и лактации применение возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами

Нет данных об отрицательном влияние препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения 2,5 %.

По 30 г в стеклянный флакон (тип стекла 3), покрытым снаружи пластиком (поливинилхлоридом), закрытым пластиковой крышкой с распылительным клапаном, с инструкцией по применению в картонной пачке.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

Лаборатории БУШАРА – РЕКОРДАТИ

68, рю Маржолен – 92300 Леваллуа-Перре, Франция

Все претензии по качеству препарата направлять:

РОССИЯ 123610 Москва, Краснопресненская наб.12,

ЦМТ, «Международная-2», офис 747

тел.: (495) 258 20 06, факс: (495) 258 20 07

Представитель фирмы

Laboratoires
BOUCHARA-RECORDATI
S.A.S. au capital de 27.500.000 EUROS
68, rue Morjolin-92300 LEVALLOIS-PERRET
R.C.S. Nanterre: B 602 056 657

А. В. Князева