ЛП-№(008074)-(РГ-RU) от 28.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2024 № 27207
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Зубные капли

Регистрационный номер:

Торговое наименование. Зубные капли.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + камфора + мяты перечной листьев масло.

Лекарственная форма. Капли для местного применения.

Состав:

Активные компоненты:

Мяты перечной листьев масло (масло мяты перечной)	– 3,1 г
Камфора рацемическая	– 6,4 г
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка (настойка валерианы)	– до 100 мл

Описание

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета, ароматного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые в стоматологии; другие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Код АТХ

A01AD11

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2024 № 27207
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает местнораздражающее (отвлекающее), умеренное обезболивающее, антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Зубная боль (до оказания стоматологической врачебной помощи).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Детский возраст старше 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Местно. Ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, прикладывают к больному зубу на 5-10 минут.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При попадании на слизистую оболочку полости рта лекарственный препарат может вызвать ощущение жжения.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2024 № 27207
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При правильном применении препарата (местно) передозировка маловероятна. При случайном приеме препарата внутрь возможно появление симптомов раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота) и сонливости.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Капли зубные при местном применении частично всасываются через слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей старше 12 лет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения лекарственным препаратом необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Капли для местного применения.

По 10 мл, 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми. По 10 мл, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми. Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку. Допускается флаконы, флаконы-капельницы вместе с равным количеством инструкций по применению помещать в коробку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.12.2024 № 27207
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

e-mail: ivff@yandex.ru