ЛП-№(014481)-(РГ-RU) от 14.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6910
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВАЛОКОРФИТУН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ВАЛОКОРФИТУН

Международное непатентованное или общепринятое (группировочное) наименование: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + Мелиссы лекарственной листьев экстракт + Мяты перечной листьев экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав

1 таблетка содержит:

активный компонент: Премикс Фито (состоящий из валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракта сухого – 35,00 мг; мелиссы лекарственной листьев экстракта сухого – 17,50 мг; мяты перечной листьев экстракта сухого – 17,50 мг; кремния диоксида осажденного – 1,40 мг) – 71,40 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Оболочка: повидон К-17, сахароза, кремния диоксид коллоидный, магния карбонат, краситель «тархун»[1], титана диоксид, тальк, воск (капол).

[1]Краситель «тархун» получают из смеси красителей: тартразин (Е102), синий блестящий (Е133).

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки светло-зеленого цвета, покрытые оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа: психолептики; снотворные и седативные средства; снотворные и седативные средства, комбинации без барбитуратов.

КОД АТХ: N05CX

Фармакологические свойства

Препарат обладает успокаивающим и спазмолитическим действием.

Валерианы корневищ с корнями экстракт оказывает успокаивающее действие.

Мелиссы лекарственной листьев экстракт – успокаивающее и спазмолитическое действие.

Мяты перечной листьев экстракт – спазмолитическое, умеренное успокаивающее действие.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, раздражительность.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6910
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозно-галактозная мальабсорбция; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы; артериальная гипотензия; холангит, желчнокаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей; беременность; период грудного вскармливания; детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не изучено. Не рекомендуется применять препарат ВАЛОКОРФИТУН в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи.

Взрослые и дети старше 12 лет:

При повышенной нервной возбудимости, раздражительности – по 2-3 таблетки, покрытые оболочкой, 2-3 раза в день.

При бессоннице – по 2-3 таблетки, покрытые оболочкой, за 30 минут – 1 час перед сном. Максимальная дневная доза составляет 12 таблеток в день.

При прекращении лечения синдрома отмены не возникает.

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении – запор.

Передозировка

Симптомы

Однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (примерно 104 таблетки препарата ВАЛОКОРФИТУН) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков; симптомы могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 часов.

Лечение

При признаках передозировки целесообразно провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6910
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

угнетающих центральную нервную систему, гипотензивных препаратов (в частности, центрального действия), обезболивающих средств, что требует коррекции доз.

Особые указания

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата, следует сообщить об этом лечащему врачу.

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

Вспомогательные вещества

Лактозы моногидрат

Препарат содержит лактозы моногидрат. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы лопарей или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

Сахароза

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Тартразин (Е102)

Может вызывать аллергические реакции. Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку, то есть, по сути, «не содержит натрия».

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 2, 4, 6, 8 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

По 50 таблеток в банки полимерные полипропиленовые с контролем первого вскрытия и амортизатором в комплекте с крышками полимерными полиэтиленовыми.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.04.2026 № 6910
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

1 банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115

Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Кревель Мойзельбах», Россия,

115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, помещ. 1/1

Тел./факс: +7 (495) 966-00-94