

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ПЕПСАН-Р®

Регистрационный номер: ЛС-002631**Торговое наименование:** ПЕПСАН-Р®**Группировочное наименование:** гвайазулен + диметикон**Лекарственная форма:** капсулы, 4 мг + 300 мг**Состав на 1 капсулу***Действующие вещества:*

Гвайазулен.....4,0 мг

Диметикон.....300,0 мг

Вспомогательные вещества (состав оболочки капсулы):

Желатин.....125,4 мг

Глицерол.....29,5 мг

Сорбитол 70% некристаллический.....28,6 мг

Краситель синий патентованный.....0,2 мг

Титана диоксид.....1,1 мг

Вода очищенная.....q.s.

Описание

Мягкие продолговатые блестящие непрозрачные синие капсулы, содержащие вязкий синий раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Гастропротекторное и ветрогонное средство.

Код АТХ: A03AX**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат. Оказывает противовоспалительное действие, снижает секрецию соляной кислоты в желудке, уменьшает газообразование в кишечнике.

Гвайазулен – обладает выраженным ~~противовоспалительным эффектом~~, ослабляет аллергические реакции, усиливает регенеративные процессы, оказывает антиоксидантное действие. Благодаря ингибирующему эффекту на освобождение гистамина из мастоцитов, клеток слизистой оболочки желудка, тормозит кислотную секрецию.

Диметикон – гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки пищеварительного канала.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Фармакодинамика

Диметикон обладает защитным действием для пищеварительной системы, образуя однородный защитный слой, выстилающий слизистую оболочку пищеварительного тракта.

Показания к применению

Симптоматическое лечение болевого синдрома и функциональных расстройств при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 14 лет.

Непереносимость фруктозы.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1 капсуле 2-3 раза в сутки перед едой (курс лечения определяется индивидуально лечащим врачом).

Особые указания

Если на фоне применения препарата в течение 5 дней не наблюдается улучшения, следует немедленно обратиться к лечащему врачу. Данный лекарственный препарат содержит 21 мг сорбитола на капсулу, поэтому применение препарата у пациентов с непереносимостью фруктозы противопоказано.

Согласно составу лекарственного препарата количество углеводов в однократной дозе препарата составляет приблизительно до 50 мг в 1 капсуле.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические реакции, боли и вздутие живота.

Передозировка

При передозировке необходимо обратиться к врачу. Возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Капсулы, 4 мг + 300 мг.

По 10 капсул в блистер (ПВХ/ПЭ/ПВДХ/алюминий).

По 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

По рецепту.

Держатель (владелец) регистрационного удостоверения:

Лаборатории МАЙОЛИ СПИНДЛЕР, Франция

6, авеню де Л'Европ 78400 Шату, Франция

Laboratoires MAYOLY SPINDLER, France

6, avenue de l'Europe 78400 Chatou, France

Производитель (готовая лекарственная форма):

Лаборатории ГАЛЕНИК ВЕРНЕН, Франция

20, рю Луи-Шарль Вернен 77190 Даммари-ле-Лис, Франция

Laboratoires GALENIQUES VERNIN, France

20, rue Louis-Charles Vernin 77190 Dammary-les-Lys, France

Производитель (фасовка (первичная ~~упаковка~~), ~~упаковка~~ (вторичная
(потребительская) упаковка, выпускающий контроль качества):

Лаборатории МАЙОЛИ СПИНДЛЕР, Франция

6, авеню де Л'Европ 78400 Шату, Франция

Laboratoires MAYOLY SPINDLER, France

6, avenue de l'Europe 78400 Chatou, France

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»

Россия, 127051, г. Москва,

ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27

Тел.: 8 (800) 500-80-22

e-mail: phv@mayoly.ru

Менеджер по регистрации
лекарственных средств



А.В. Иванова