ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ГИОКСИЗОН

Регистрационный номер

Торговое название препарата
Гиоксизон

МНН или группировочное название
Гидрокортизон + Окситетрациклин[&]

Лекарственная форма
мазь для местного и наружного применения

Описание
Мазь желтого цвета.

Состав
1 г мази содержит:
активные вещества: гидрокортизона ацетат (в пересчете на 100 % вещество) – 0,01 г, окситетрациклина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) – 0,03 г;
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (нипагин), вазелин – до 1 г.

Фармакотерапевтическая группа
Глюкокортикостероид для местного применения + антибиотик-тетрациклин
Код АТХ: D07CA01.

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат, угнетает развитие воспалительных реакций кожи, особенно аллергического происхождения, осложненных бактериальной инфекцией, в результате суммарного действия компонентов, входящих в состав препарата. Окситетрациклин - антибиотик из группы тетрациклинов, оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, Rickettsia spp., Treponema spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp. Гидрокортизон – глюкокортикостероид, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэкссудативный и противозудный эффекты. Тормозит фагоцитоз; уменьшает синтез простагландинов и лейкотриенов путем угнетения активности фосфолипазы А2 и уменьшения высвобождения арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек. Угнетает освобождение интерлейкинов и др. цитокинов, вызывающих воспалительный процесс; тормозит освобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Показания к применению
Дерматит новорожденных (пузырный и эксфолиативный), инфицированная опрелость, фолликулиты, фурункулез, карбункул, импетиго, рожистое воспаление; инфицированные экземы и раны, эрозии; крапивница новорожденного; простой и аллергический дерматит, себорея; «солнечные» эритематозные высыпания; мультиформная экссудативная эритема; укусы насекомых; аллергические и гнойные заболевания наружного слухового прохода; варикозные язвы голени, ожоги, отморожения.

Противопоказания
Гиперчувствительность, туберкулез кожи, опухоли кожи, предраковые состояния, микоз, вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа); беременность, период лактации (при применении на обширных очагах поражения).

Способ применения и дозы
Местно, наружно.
Мазь в количестве 0,5-1 г наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день или под стерильную марлевую повязку.
Длительность лечения индивидуальна.

Побочное действие
Редко возможны – аллергические реакции, раздражение кожи, зуд, сыпь. При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности - системные побочные эффекты глюкокортикостероидов. При применении на коже лица – возможны телеангиэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта.

Передозировка
О случаях передозировки препарата Гиоксизон мазь не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания
Во время лечения глюкокортикостероидами (ГКС) не следует проводить вакцинацию против оспы и планировать другие виды иммунизации (в связи с иммунодепрессивным эффектом ГКС).
У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности и под окклюзионные повязки.
При необходимости применения препарата на коже лица, лечение должно быть коротким из-за повышенного всасывания и возможности появления побочного действия.

Форма выпуска
Мазь для местного и наружного применения.
По 10 г в тубы алюминиевые с мембраной. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения
Список Б. Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии
ОАО «НИЖФАРМ», Россия
603950, г. Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
Тел.: (831) 278-80-88
Факс: (831) 430-72-28
Интернет: http://www.nizhpharm.ru

Представитель ОАО «Нижфарм» В.А. Балабаш

РОСЗДРАВНАДЗОР
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 4

Для документов

50020