

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Фосфоглив®

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Фосфоглив®**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды

Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения**Состав на 1 мл***Действующие вещества:*

Фосфолипиды	50,0 мг
(в пересчете на фосфатидилхолин)	
Натрия глицирризинат	20,0 мг
(Тринатриевая соль глицирризиновой кислоты)	
(в пересчете на 100 % вещество)	

Вспомогательные вещества:

альфа-Токоферола ацетат	до 0,3 мг
вода для инъекций	до 1,0 мл

Описание: опалесцирующая жидкость белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом.**Фармакотерапевтическая группа:** средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей; средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства.**Код АТХ:** A05BA**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Комбинированное средство. Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.

Глицирризиновая кислота обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, повышения фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-

киллеров. Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Глицирризиновая кислота потенцирует действие эндогенных глюкокортикостероидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.

При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.

Фосфатидилхолин (основной компонент фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие. Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает функцию печени, ингибирует формирование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.

Фармакокинетика

Глицирризиновая кислота

Глицирризиновая кислота, попадая в системный кровоток, связывается с альбумином и транспортируется в печень. Выделяется глицирризиновая кислота с желчью в неизменном виде, в остаточном количестве – с мочой. При поступлении в кишечник, часть ее под воздействием β -глюкуронидазы кишечной микрофлоры гидролизуется в β -глицирретовую кислоту, которая подвергается обратному всасыванию, обуславливая тем самым энтерогепатическую циркуляцию.

По экспериментальным данным, включение глицирризиновой кислоты в фосфолипидные наночастицы способствует улучшению ее фармакокинетических и фармакодинамических свойств, пролонгирует циркуляцию в крови и увеличивает поступление в печень.

Фосфатидилхолин

Связываясь, главным образом, с липопротеидами высокой плотности, фосфатидилхолин поступает, в частности, в клетки печени. Период полувыведения холинового компонента составляет 66 часов, а ненасыщенных жирных кислот – 32 часа.

Показания к применению

Фосфоглив® показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет для лечения:

- жировой дегенерации печени (гепатоз), алкогольных, токсических, в том числе лекарственных поражений печени;

- в составе комплексной терапии вирусных гепатитов (острых и хронических), цирроза печени и псориаза.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к фосфолипидам, натрия глицирризинату или любому из вспомогательных веществ;
- антифосфолипидный синдром;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

- Синдром портальной гипертензии;
- артериальная гипертензия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности, применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет.

Вводить внутривенно струйно, медленно по 10 мл ежедневно 2 раза в день утром и вечером в течение 10 дней с последующим переходом на пероральный прием препарата в виде капсул.

Продолжительность курса лечения может быть увеличена по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможно появление кожной сыпи (при повышенной индивидуальной чувствительности), которая исчезает после отмены препарата.

При превышении суточных доз могут отмечаться задержка натрия и жидкости, отеки, повышение артериального давления, гипокалиемия (см. раздел «Передозировка»).

Передозировка

При превышении суточных доз могут отмечаться задержка натрия и жидкости, отеки, повышение артериального давления, гипокалиемия. При появлении указанных симптомов,

в зависимости от их выраженности, необходимо уменьшить дозу препарата и/или назначить спиронолактон по 50-100 мг в сутки.

Случаев передозировки при введении препарата Фосфоглив® зарегистрировано не было.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Глицирризиновая кислота, входящая в состав препарата, является синергистом кортикостероидных гормонов, она усиливает и продлевает их действие.

Особые указания

Содержимое ампулы нельзя смешивать с другими растворами.

Вводить только внутривенно струйно.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Данные о негативном влиянии препарата Фосфоглив® на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, отсутствуют.

Форма выпуска

Раствор для внутривенного введения, 20 мг/мл + 50 мг/мл.

По 10 мл препарата в ампулы из светозащитного стекла.

По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C

Хранить в защищенном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»),

Россия, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д 28,

тел./факс: (347) 272 92 85,

www.pharmstd.ru.

Производитель

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»),

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д 28,

тел./факс: (347) 272 92 85,

www.pharmstd.ru.