ЛП-№(008259)-(РГ-RU) от 24.12.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28338
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

# ГЛЮКОЗАМИН

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование.**
ГЛЮКОЗАМИН

**Международное непатентованное наименование.**
Глюкозамин

**Лекарственная форма.**
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1500 мг

**Состав на один пакет:**
*Действующее вещество:*
Глюкозамина сульфата натрия хлорид – 1884 мг
(в пересчете на глюкозамина сульфат 1500 мг)
*Вспомогательные вещества:* Сорбитол, лимонной кислоты моногидрат, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000), аспартам.

**Описание.**
Порошок белого или почти белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа.**
Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща.

**Код АТХ.** M01AX05

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28338
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**Фармакологические свойства.**

***Фармакодинамика.***

Препарат обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость капсулы, восстанавливает ферментные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

***Фармакокинетика.***

Всасывание в желудочно-кишечном тракте 90%, биодоступность 26%, период полувыведения - 70 часов.

**Показания к применению.**

Лекарственный препарат ГЛЮКОЗАМИН показан к применению у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет при:

- Первичном и вторичном остеоартрите;
- Остеохондрозе;
- Спондилоартрозе.

**Противопоказания.**

- Индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамину, аспартаму и/или к любому из вспомогательных веществ.
- Фенилкетонурия (из-за содержания в препарате аспартама).
- Беременность и период грудного вскармливания (из-за отсутствия научных клинических данных.)
- Детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью.**

При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) возрастает вероятность развития аллергических реакций.

С осторожностью принимают при бронхиальной астме, сахарном диабете.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания.**

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28338
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Препарат ГЛЮКОЗАМИН противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы.**

*Взрослые*

1 пакет 1 раз в сутки.

Симптоматический эффект наступает через 2-3 недели после начала приема препарата. Минимальный курс терапии составляет 4-6 недель.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач.

*Дети старше 12 лет*

Режим дозирования аналогичен режиму дозирования для взрослых.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач.

*Дети от 0 до 12 лет*

Безопасность и эффективность препарата ГЛЮКОЗАМИН у детей до 12 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

*Способ применения*

Внутрь. Содержимое одного пакета растворяют в 200 мл воды.

**Побочное действие.**

Переносимость препарата хорошая, в отдельных случаях возможны:

*нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* крапивница, зуд, эритема;

*нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта*: гастралгия, метеоризм, диарея, запор, тошнота;

*нарушения со стороны нервной системы*: головная боль, сонливость.

**Передозировка.**

Случаи передозировки неизвестны.

*Лечение:* промывание желудка, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает – полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

Препарат совместим с парацетамолом, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюкокортикостероидами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28338
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**Особые указания.**

Не рекомендуется принимать детям до 12 лет из-за отсутствия научных данных для этой категории пациентов. При назначении препарата пациентам с нарушенной толерантностью к глюкозе, с выраженной печеночной и почечной недостаточностью необходим врачебный контроль. Разовая доза препарата 3,95 г содержит 151 мг натрия. Это следует учитывать при назначении пациентам, которым показана строгая бессолевая диета. Риск аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

Данные об отрицательном влиянии препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций отсутствуют.

**Форма выпуска.**

По 3,95 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного или материала комбинированного «Буфлен» или ламинированной бумаги.

По 3, 5, 7, 10, 14, 20 или 30 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 50, 100, 200, 400 пакетов вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

**Условия хранения.**

При температуре не выше 25 ºС.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**Срок годности.**

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска.**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932) 33-42-73, факс: (4932) 33-42-72, ivff37.ru