

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому)

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Международное непатентованное или группировочное наименование: деготь березовый + трибромфенолят висмута и висмута оксида комплекс

Лекарственная форма: линимент

Состав

100 г препарата содержат:

Действующие вещества:

деготь березовый – 3 г

трибромфенолят висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ) – 3 г

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 5 г, клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) – 89 г.

Описание: линимент от светло-желтого до серовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое, дезинфицирующее и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей.

Трибромфенолят висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фенолу, его производным или вспомогательным компонентам препарата; острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прерывании грудного вскармливания.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. На пораженные участки кожи накладывают марлевую салфетку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: при длительном применении возможно раздражение кожи.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: зуд, сыпь.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучено.

Особые указания

Деготь березовый, входящий в состав линимента, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому летом следует избегать пребывания на солнце во время лечения препаратом.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или начнутся нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения.

После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки для предотвращения попадания линимента в рот, в нос, в глаза. В случае попадания линимента в глаза, их необходимо промыть водой и обратиться к врачу.

Линимент имеет неприятный специфический запах и оставляет следы на одежде.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Линимент.

По 30 г, 35 г в тубы алюминиевые с бушонами полимерными.

По 1000 г в банки полимерные с винтовой горловиной и крышкой полимерной навинчиваемой.

Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

8 банок по 1000 г вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование, адрес производителя и адрес места производства лекарственного препарата/ организация, принимающая претензии

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86.

Генеральный директор
ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»



Ю.П. Швец