ЛП-№(012300)-(РГ-RU) от 31.10.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27118
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Декспантенол + Хлоргексидин

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Декспантенол + Хлоргексидин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Декспантенол + Хлоргексидин

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав

на 100 г крема:

Действующие вещества:	
декспантенол	5,25 г
хлоргексидина биглюконат, субстанция-раствор 20 %	4,01 г
в пересчете на хлоргексидина биглюконат	0,802 г
Вспомогательные вещества:	
парафин жидкий	12,00 г
пропиленгликоль	9,00 г
макрогол цетостеариловый эфир	7,00 г
цетостеариловый спирт	9,00 г
калия дигидрофосфат	0,37 г
вода очищенная	до 100,0 г

Описание: белый или почти белый однородный крем.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; бигуаниды и амидины.

Код АТХ: D08AC52.

Фармакологические свойства

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27118
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Фармакодинамика

Декспантенол – витамин группы В – в организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и оказывает регенерирующее, витаминное, метаболическое и противовоспалительное действие. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Хлоргексидин – является противомикробным и антисептическим средством. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т. ч. *Staphylococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, а также дрожжеподобных грибов и дерматофитов. Сохраняет активность в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.

Препарат Декспантенол + Хлоргексидин уменьшает боль благодаря охлаждающему эффекту.

Фармакокинетика

При наружном применении декспантенол быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту (витамин B_5). Пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (главным образом, с бета-глобулином и альбумином). Концентрация ее в крови 0,5–1 мг/л, в сыворотке крови – 100 мкг/л.

Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в коэнзим А) и выводится в неизмененном виде.

Хлоргексидин при наружном применении практически не всасывается.

Показания к применению

Обработка и лечение небольших ран с угрозой инфицирования, таких как ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги; инфицированных поверхностных повреждений кожи; трещин сосков молочных желез в период грудного вскармливания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27118
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

При хронических ранах, например, трофических язвах голени, пролежнях, а также при операционных ранах.

Противопоказания

Препарат не следует применять при гиперчувствительности к декспантенолу, хлоргексидину или любому из компонентов препарата; в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства); не следует наносить на поврежденную барабанную перепонку.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Однако следует избегать применения препарата на больших поверхностях кожи.

Если препарат применяется для обработки трещин сосков в период грудного вскармливания, то он должен быть смыт перед грудным вскармливанием.

Способ применения и дозы

Наружно.

Крем наносят тонким слоем один или несколько раз в сутки на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

Побочное действие

При применении препарата возможны аллергические реакции, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, а также тяжелые аллергические реакции, включая анафилаксию.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27118
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

Декспантенол даже в высоких дозах хорошо переносится и не токсичен. Случаи гипервитаминоза не описаны.

При отравлении хлоргексидином описаны случаи возрастания уровня аминотрансферазы.

При случайном попадании внутрь практически не абсорбируется. При необходимости проводится симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В качестве меры предосторожности в отношении возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация) не следует применять в комплексе с другими антисептиками.

Хлоргексидин несовместим с мылом и другими анионными соединениями.

Особые указания

Следует избегать попадания в глаза, уши и на слизистые оболочки, нельзя принимать внутрь (при приеме по ошибке больших количеств внутрь следует сразу обратиться к врачу).

Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также кусаные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (опасность столбняка).

Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими, или рана не заживает в течение 10–14 дней, то в этом случае следует обратиться к врачу. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана отекает и появляются сильные боли или повреждение кожных покровов сопровождается лихорадкой (опасность сепсиса).

Препарат не следует применять для лечения кожных раздражений, не склонных к инфицированию (например, солнечные ожоги).

Частое нанесение на один и тот же участок кожи может привести к появлению раздражения. Препарат предназначен для обработки и лечения небольших ран, следует избегать нанесения в больших количествах.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27118
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Препарат Декспантенол + Хлоргексидин содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит), а также пропиленгликоль, который может раздражать кожу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и на работу с другими механизмами.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 5,25 % + 0,802 %.

По 25 г, 30 г, 50 г или 100 г препарата помещают в тубу алюминиевую, или в тубу из комбинированного материала с бушоном для упаковывания лекарственных средств.

25 г препарата помещают в банку из темного стекла III гидролитического класса НС-3 типа БТС для хранения лекарственных средств с треугольным венчиком, укупоренную крышкой полиэтиленовой натягиваемой.

Одну банку или тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ПРОМОМЕД РУС», Российская Федерация

Адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Производитель

АО «Биохимик», Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27118
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А

Адрес места производства: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15А

Телефон: +7 (8342) 38 03 68

Электронная почта: biohimic@promomed.pro

Адрес в сети интернет: promomed.ru

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «ПРОМОМЕД РУС», Российская Федерация

Адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Телефон: 8 800 222 95 63; 8 800 777 86 04 (круглосуточно)

Электронная почта: hot_line@promomed.pro