МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000871-061216
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭКСДЖИВА®

раствор для подкожного введения, 120 мг (70 мг/мл)

Амджен Европа Б.В., Нидерланды

Изменение № _6_

Дата внесения Изменения «____» 061216 20___.

Старая редакция	Новая редакция
ФОРМА ВЫПУСКА Раствор для подкожного введения 70 мг/мл. По 1,7 мл препарата во флакон объемом 3 мл из стекла I гидролитического класса с 13 мм эластомерной пробкой, алюминиевым колпачком и отламывающимся полипропиленовым колпачком. По 1 или 4 флакона помещают в пачку картонную, снабженную картонным фиксатором, вместе с инструкцией по применению. На каждую пачку наклеивают прозрачную защитную этикетку - контроль первого вскрытия, имеющую продольную цветную полосу.	**ФОРМА ВЫПУСКА** Раствор для подкожного введения 70 мг/мл. По 1,7 мл препарата во флакон объемом 3 мл из стекла I гидролитического класса с 13 мм эластомерной пробкой, алюминиевым колпачком и отламывающимся полипропиленовым колпачком. По 1 или 4 флакона помещают в пачку картонную, снабженную картонным фиксатором, вместе с инструкцией по применению. Или по 1 флакону помещают в контурную ячейковую упаковку и затем в пачку картонную, вместе с инструкцией по применению. На каждую пачку наклеивают прозрачные защитные этикетки - контроль первого вскрытия, имеющие продольную цветную полосу.

Менеджер по регистрации
ООО «Амджен» Абрикосова Ю.Е.

"Амджен" Amgen LLC отдел регистрации