МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003845- 130519
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Имипенем+Циластатин

порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг + 500 мг

АО "Химфарм", Республика Казахстан

Изменение № 2

Дата внесения Изменения "____" 130519 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг+500 мг. Количество препарата, соответствующее 500 мг имипенема и 500 мг циластатина, во флаконы из стекла, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатые колпачками алюминиевыми или колпачками комбинированными типа "FLIP OFF". На каждый флакон наклеивают этикетку. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 80 флаконов вместе с равным количеством инструкций по применению упаковывают в поддон из картона, оклеенный пленкой термоусадочной (для стационара).	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг+500 мг. Количество препарата, соответствующее 500 мг имипенема и 500 мг циластатина, во флаконы из стекла, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатые колпачками алюминиевыми или колпачками комбинированными типа "FLIP OFF". На каждый флакон наклеивают этикетку. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 80 флаконов вместе с равным количеством инструкций по применению упаковывают в поддон из картона, оклеенный пленкой термоусадочной, или по 100 фла-

Старая редакция	Новая редакция
	конов вместе с равным количеством инструкций по применению упаковывают в коробку из картона (для стационара).

Представитель фирмы Е.В. Новикова