МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Абакавир+Ламивудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,

600 мг + 300 мг

Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед, Индия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 061021 20____ г

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название Абакавир+Ламивудин	**Торговое наименование** Абакавир+Ламивудин
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ Поскольку Абакавир+Ламивудин является комбинированным препаратом, то возможно проявление нежелательных реакций, характерных для абакавира и ламивудина. Для многих перечисленных ниже нежелательных реакций остается неясным, связано ли их появление с действием активных веществ данного препарата, одновременным использованием других лекарственных препаратов (применяющихся для лечения ВИЧ),	**Побочное действие** Сводные данные по профилю безопасности Нежелательные реакции, зарегистрированные во время применения абакавира и ламивудина, соответствовали известным профилям безопасности абакавира и ламивудина при применении в виде монопрепаратов. Для многих из этих нежелательных реакций остается неясным, связано ли их появление с одним из действующим веществ препарата, одновременным использованием широкого спектра

Старая редакция	Новая редакция
или они являются проявлением основного заболевания. Характерные для приема абакавира или ламивудина нежелательные реакции, представленные ниже, перечислены в соответствии с поражением органов и систем органов и частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: *очень часто* (≥1/10), *часто* ((≥ 1/100, < 1/10), *нечасто* (≥ 1/1000. < 1/100), *редко* (≥ 1/10000 и < 1/1000) и *очень редко* (< 1/10000, включая отдельные случаи). Категории частоты были сформированы на основании клинических исследований препарата и пострегистрационного наблюдения. Многие из представленных побочных реакций (тошнота, рвота, диарея, повышение температуры, апатия, сыпь) часто возникают у пациентов с гиперчувствительностью к абакавиру. Поэтому пациентов с любым из этих симптомов следует тщательно обследовать для	других лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, или же они являются проявлением основного заболевания. Многие из нежелательных реакций, представленных в таблице ниже (тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, вялость, сыпь), часто возникают у пациентов с гиперчувствительностью к абакавиру. Поэтому пациентов с любым из этих симптомов следует тщательно обследовать для подтверждения развития реакции гиперчувствительности. Были зарегистрированы очень редкие случаи мультиформной эритемы, синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза, для которых гиперчувствительность к абакавиру не может быть исключена. В таких случаях следует прервать применение лекарственных препаратов, содержащих абакавир, без возможности возобновления. <u>Перечень нежелательных реакций</u>

Старая редакция	Новая редакция
подтверждения развития реакции гиперчувствительности (РГЧ). Если прием препарата Абакавир+Ламивудин был прекращен в связи с возникновением одного из этих симптомов, и, затем, было принято решение о возобновлении приема абакавира, его следует начинать только под непосредственным наблюдением врача. Помимо нежелательных реакций, описанных в клинических исследованиях, в таблице ниже представлены нежелательные реакции, выявленные при пострегистрационном применении абакавира и ламивудина. Данные реакции были выбраны для включения в таблицу ввиду возможной причинной связи с абакавиром и/или ламивудином. *Данные клинических исследований и пострегистрационные данные*	Нежелательные реакции, связанные или предположительно связанные с применением абакавира или ламивудина, перечислены в соответствии с поражением органов и систем органов и абсолютной частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 и < 1/10), нечасто (> 1/1 000 и < 1/100), редко (>1/10 000 и <1/1 000), очень редко (<1/10 000).

Система организма	**Абакавир**	**Ламивудин**
Нарушения со сторон		*Нечасто:* нейтропения,

Система органов	**Абакавир**	**Ламивудин**
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы	-	*Нечасто:* нейтропения (иногда серьезная), анемия (иногда серьезная), тромбоцитопения *Очень редко:*

ЛП-004209-061021

Старая редакция			Новая редакция		
ы крови и лимфатической системы		анемия, тромбоцитопения *Очень редко*: истинная эритроцитарная аплазия			истинная эритроцитарная аплазия
Нарушения со стороны иммунной системы	*Часто*: реакции гиперчувствительности к препарату		*Нарушения со стороны иммунной системы*	*Часто:* гиперчувствительность	-
Нарушения со стороны обмена веществ и питания	*Часто:* анорексия, гиперлактатемия* *Очень редко*: лактоацидоз*	*Очень редко:* лактоацидоз*	*Нарушения со стороны обмена веществ и питания*	*Часто:* анорексия *Очень редко:* лактоацидоз	*Очень редко:* лактоацидоз
Нарушения со стороны нервной системы	*Часто*: головная боль	*Часто*: головная боль, бессонница *Очень редко*: парестезии, описана периферическая нейропатия (причинно-следственная связь с лечением	*Нарушения со стороны нервной системы*	*Часто:* головная боль	*Часто:* головная боль, бессонница *Очень редко:* описаны случаи развития

Старая редакция			Новая редакция		
		не установлена)			периферической нейропатии (или парестезии)
Нарушения со стороны органов дыхания		*Часто:* кашель, назальные симптомы			
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта	*Часто*: тошнота, рвота, диарея *Редко*: панкреатит, однако причинно-следственная связь с приемом абакавира не установлена*	*Часто*: тошнота, рвота, боль в верхних отделах живота, диарея *Редко*: повышение активности сывороточной амилазы, панкреатит (хотя причинно-следственная связь с приемом ламивудина не установлена)*	*Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения*	-	*Часто:* кашель, назальные симптомы
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей		*Нечасто*: временное повышение биохимических показателей	*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта*	*Часто:* тошнота, рвота, диарея *Редко:* описаны случаи развития панкреатита, однако	*Часто:* тошнота, рвота, боль или спазмы в животе, диарея *Редко:* повышение

ЛП-004209-061021

Старая редакция			Новая редакция		
		функции печени (АСТ, АЛТ) *Редко:* гепатит		причинно-следственная связь с приемом абакавира не установлена	активности сывороточной амилазы. Описаны случаи развития панкреатита
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей	*Часто*: сыпь (без системных симптомов)* *Очень редко*: экссудативная многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз*	*Часто*: сыпь, алопеция* *Редко:* антионевротический отек	*Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей*	-	*Нечасто:* временное повышение биохимических показателей функции печени (АСТ, АЛТ) *Редко:* гепатит
Общие расстройства и нарушения в месте введения	*Часто:* повышение температуры тела, сонливость, чувство усталости	*Часто*: чувство усталости, недомогание, повышение температуры тела			
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и		*Часто:* артралгия, поражения мышц* *Редко*: рабдомиолиз*	*Нарушения со стороны кожи и*	*Часто:* сыпь (без системных симптомов)	*Часто:* сыпь, алопеция

Старая редакция	Новая редакция		
*соединительной ткани**			
подкожных тканей	*Очень редко:* мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз	*Редко:* ангионевротический отек	
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани		*Часто:* артралгия, поражения мышц *Редко*: рабдомиолиз	
Общие расстройства и нарушения в	*Часто:* повышение температуры тела, вялость,	*Часто:* чувство усталости, недомогание,	

* *нежелательные реакции, описанные в клинических исследованиях.*

В очень редких случаях при применении препарата Абакавир+Ламивудин могут возникнуть мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. При их возникновении необходимо отменить препарат Абакавир+Ламивудин.

Дети

Данные по безопасности, подтверждающие однократное дозирование комбинированного препарата у детей, были получены в исследовании ARROW (COL 105677), в котором 669 детей, инфицированных ВИЧ-1, получали абакавир и ламивудин 1 или 2 раза в сутки. В данной группе 104 ребенка, инфицированных ВИЧ-1, с массой тела не менее 25 кг получали абакавир и ламивудин в составе комбинированного препарата 1 или 2 раза в сутки. Не было выявлено никаких дополнительных сигналов

Старая редакция	Новая редакция
по безопасности у детей, принимавших препарат 1 или 2 раза в сутки по сравнению с взрослыми. **Описание отдельных нежелательных реакций** **Гиперчувствительность** РГЧ к абакавиру была определена как общая нежелательная реакция при лечении препаратами, содержащими абакавир. Признаки и симптомы РГЧ приведены ниже. Данные признаки и симптомы были выявлены во время клинических исследований или при пострегистрационном наблюдении. Симптомы и признаки, встречающиеся не менее чем у 10 % пациентов с РГЧ, выделены полужирным шрифтом. Практически у всех пациентов с РГЧ развиваются повышение температуры тела и/или сыпь (обычно макулопапулезная или уртикарная) как часть синдрома, однако реакции могут протекать и без сыпи или повышения температуры тела. Другие основные	*месте введения* | чувство усталости | повышение температуры тела ***Описание отдельных нежелательных реакций*** *Гиперчувствительность к абакавиру* Признаки и симптомы этой реакции гиперчувствительности (РГЧ) приведены ниже. Данные признаки и симптомы выявлены во время клинических исследований или при пострегистрационном наблюдении. Симптомы и признаки, зарегистрированные **не менее чем у 10 % пациентов** с РГЧ, выделены полужирным шрифтом. Практически у всех пациентов с РГЧ развиваются повышение температуры тела и/или сыпь (обычно макулопапулезная или уртикарная) как часть синдрома, однако реакции могут протекать и без сыпи или повышения температуры тела. Другие основные симптомы включают в себя

Старая редакция	Новая редакция
симптомы включают в себя симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы или конституциональные симптомы, такие как сонливость или недомогание. *Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* **сыпь** (обычно макулопапулезная или уртикарная). *Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* **тошнота, рвота, диарея, боль в животе,** изъязвления слизистой оболочки рта. *Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:* **одышка, кашель,** боль в горле, респираторный дистресс-синдром взрослых, дыхательная недостаточность. *Нарушения со стороны нервной системы:* **головная боль,** парестезия. *Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы:* лимфопения. *Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:* **повышение биохимических**	симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, симптомы со стороны дыхательной системы или конституциональные симптомы, такие как вялость и недомогание. *Нарушения со стороны кожи:* **сыпь** (обычно макулопапулезная или уртикарная). *Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* **тошнота, рвота, диарея, боль в животе**, изъязвление слизистой оболочки рта. *Нарушения со стороны дыхательной системы:* **одышка, кашель**, боль в горле, респираторный дистресс-синдром взрослых, дыхательная недостаточность. *Нарушения со стороны нервной системы/психики:* **головная боль**, парестезия. *Нарушения со стороны крови:* лимфопения. *Нарушения со стороны печени и поджелудочной железы:* **повышение биохимических показателей функции печени,**

Старая редакция	Новая редакция
показателей функции печени, гепатит, печеночная недостаточность. *Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:* **миалгия,** редко - миолиз, артралгия, повышение активности креатинфосфокиназы. *Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:* повышение концентрации креатинина, почечная недостаточность. *Общие расстройства и нарушения в месте введения:* повышение температуры тела, чувство усталости, недомогание, отек, лимфаденопатия, артериальная гипотензия, конъюнктивит, анафилаксия. Возобновление приема препарата Абакавир+Ламивудин после РГЧ на абакавир приводит к быстрому возвращению симптомов в течение нескольких часов. Повторная РГЧ обычно протекает более тяжело, чем первая, и может включать угрожающую жизни артериальную гипотензию и смерть. В редких	гепатит, печеночная недостаточность. *Нарушения со стороны костно-мышечной системы:* **миалгия**, редко — миолиз, артралгия, повышение активности креатинфосфокиназы. *Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:* повышение концентрации креатинина в сыворотке крови, почечная недостаточность. *Прочее*: **повышение температуры тела, вялость, недомогание**, отек, лимфаденопатия, артериальная гипотензия, конъюнктивит, анафилаксия. Симптомы, связанные с данной РГЧ, усиливаются при продолжении терапии и могут быть угрожающими жизни, а также в редких случаях приводили к летальному исходу. Возобновление приема абакавира после РГЧ на абакавир приводит к быстрому повторному появлению симптомов в течение нескольких часов. Повторная РГЧ обычно

Старая редакция	Новая редакция
случаях реакции также возникают при возобновлении приема абакавира после его отмены, вызванной появлением всего одного из основных симптомов гиперчувствительности (см. выше), и в очень редких случаях эта реакция возникает при возобновлении приема абакавира пациентами, у которых до его отмены не отмечалось никаких симптомов РГЧ (т.е. у пациентов, которых ранее считали переносящими терапию абакавиром). Подробную информацию о клиническом ведении случая подозреваемой РГЧ на абакавир смотрите в разделе «Особые указания».	протекает в более тяжелой форме, чем при первичном проявлении, и может включать угрожающую жизни артериальную гипотензию и смерть. Иногда подобные реакции также возникали при возобновлении приема абакавира после его отмены, вызванной появлением одного из основных симптомов гиперчувствительности (см. выше), и в очень редких случаях реакции наблюдались при возобновлении приема абакавира пациентами, у которых до его отмены не отмечалось никаких симптомов РГЧ (т.е. у пациентов, которых ранее считали переносящими терапию абакавиром).
Имеются сообщения о развитии лактоацидоза, в том числе с летальным исходом, обычно сопровождающегося тяжелой гепатомегалией со стеатозом, вследствие АРТ аналогами нуклеозидов.	*Метаболические показатели* Во время антиретровирусной терапии (АРТ) может наблюдаться увеличение массы тела и повышение концентрации липидов и глюкозы в крови.
Применение комбинированной АРТ было ассоциировано с перераспределением жировой ткани	*Синдром восстановления иммунитета* У ВИЧ-инфицированных пациентов с тяжелым иммунодефицитом в

ЛП-004209-061021

Старая редакция	Новая редакция
(липодистрофия) у пациентов с ВИЧ, включая уменьшение подкожно-жирового слоя па лице и конечностях, увеличение виутрибрюшного и висцерального жира, увеличение молочных желез и дорсоцервикальное отложение жира («горб буйвола»). Применение комбинированной АРТ было ассоциировано с метаболическими нарушениями, такими как гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, инсулипорезистентность, гипергликемия и гиперлактатемия. У ВИЧ-инфицированных пациентов с тяжелым иммунодефицитом во время начала комбинированной АРТ могут возникнуть воспалительные реакции на бессимптомные или резидуальные оппортунистические инфекции. Также были зарегистрированы случаи аутоиммунных заболеваний (например, болезнь Грейвса), происходящих в условиях иммунной реактивации, однако представленные сроки проявления заболевания	начале комбинированной антиретровирусной терапии (кАРТ) возможно развитие воспалительной реакции на фоне бессимптомных оппортунистических инфекций или их остаточных явлений. Аутоиммунные заболевания (такие как болезнь Грейвса и аутоиммунный гепатит) также наблюдались на фоне восстановления иммунитета, однако время первичных проявлений варьировало и заболевание могло возникать через много месяцев после начала терапии. *Остеонекроз* Зарегистрированы случаи остеонекроза, особенно у пациентов с общепризнанными факторами риска, на поздней стадии ВИЧ-инфекции либо при длительной кАРТ. Частота возникновения данного явления неизвестна. *Дети* Данные по безопасности в поддержку применения абакавира и ламивудина один раз в сутки были получены в исследовании ARROW

Старая редакция	Новая редакция
являются более разнообразными, и эти явления могут произойти через много месяцев после начала терапии. Были зарегистрированы случаи остеонекроза, особенно у пациентов с общепризнанными факторами риска, на поздней стадии ВИЧ-инфекции либо при длительной комбинированной АРТ. Частота возникновения данного явления неизвестна.	(COL105677), в котором 669 детей, инфицированных ВИЧ-1 (в возрасте от 12 месяцев до 17 лет включительно), получали абакавир и ламивудин один или два раза в сутки. В данной группе 104 ребенка, инфицированных ВИЧ-1, с массой тела не менее 25 кг, получали абакавир и ламивудин один раз в сутки. У пациентов детского возраста, принимавших абакавир и ламивудин один или два раза в сутки, не выявлено дополнительных проблем, связанных с безопасностью, по сравнению со взрослыми.
Особые указания …	**Особые указания** … *Митохондриальная дисфункция в результате внутриутробного воздействия* Аналоги нуклеозидов и нуклеотидов способны вызывать различную степень повреждения митохондрий, что наиболее выражение проявляется при применении ставудина, диданозина и зидовудина. Были зафиксированы случаи развития

Старая редакция	Новая редакция
	митохондриальной дисфункции у ВИЧ-отрицательных детей, подвергавшихся воздействию аналогов нуклеозидов внутриутробно и/или после рождения. Основными нежелательными реакциями являлись гематологические нарушения (анемия, нейтропения) и нарушения обмена веществ (гиперлактатемия, гиперлипаземия). Данные нежелательные реакции часто были транзиторными. Были зарегистрированы редкие случаи неврологических расстройств с поздним началом (повышенный тонус мышц, судороги, нарушения поведения). Являются ли данные неврологические расстройства транзиторными или постоянными, в настоящее время неизвестно. Вероятность митохондриальной дисфункции следует рассматривать у любого ребенка, подвергавшегося внутриутробному воздействию аналогами нуклеозидов и нуклеотидов, с выраженными клиническими симптомами неясной

Старая редакция	Новая редакция
	этиологии, в особенности неврологическими расстройствами. Представленные данные не влияют на текущие национальные рекомендации по использованию антиретровирусной терапии у беременных женщин для профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. … **Синдром восстановления иммунитета** При наличии у ВИЧ-инфицированных пациентов с тяжелым иммунодефицитом бессимптомных оппортунистических инфекций или их остаточных явлений на момент начала АРТ, проведение такой терапии может привести к усилению симптоматикиоппортунистических инфекций,гепатомегалия, жировая дистрофия печени, оппортунистические инфекции, гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, инсулинорезистентность, гипергликемия, а также остеонекроз.

Старая редакция	Новая редакция
	Обычно эти реакции возникают в течение первых недель или месяцев после начала АРТ. Типичными примерами являются цитомегало-вирусный ретинит, генерализованная или очаговая инфекция, вызванная микобактериями, и пневмония, вызванная *Pneumocystisjirovecii* (*P. carinii*). Появление любых симптомов воспаления требует немедленного обследования и, при необходимости, лечения. Аутоиммунные заболевания (такие как болезнь Грейвса, полимиозит, синдром Гийена-Барре и аутоиммунный гепатит) также наблюдались на фоне восстановления иммунитета, однако время первичных проявлений варьировало, и заболевание могло возникать через много месяцев после начала терапии и иметь атипичное течение.
Форма выпуска	**Форма выпуска**
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и ПВХ пленки	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг

ЛП-004209-061021

Старая редакция	Новая редакция
янтарного цвета. По 1, 3 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 100, 500 или 1000 таблеток в полиэтиленовый пакет. По 1 пакету в банку из ПЭВП с силикагелем, запаянную алюминиевой фольгой с полиэтиленовым покрытием, с навинчиваемой крышкой. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеющуюся. По 1, 6, 12 или 24 банки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку – коробку из гофрированного картона (для стационаров).	*При производстве препарата на Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед, Индия:* По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и ПВХ пленки янтарного цвета. По 1, 3 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 100, 500 или 1000 таблеток в полиэтиленовый пакет. По 1 пакету в банку из ПЭВП с силикагелем, запаянную алюминиевой фольгой с полиэтиленовым покрытием, с навинчиваемой крышкой. На банку наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеющуюся. По 1, 6, 12 или 24 банки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку – коробку из гофрированного картона (для стационаров). *При производстве препарата на ООО «ФармКонцепт», Россия:* По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и ПВХ пленки.

Старая редакция	Новая редакция
	По 1, 3 или 10 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку. По 50, 100 таблеток в банку полимерную с навинчиваемой крышкой из полиэтилена низкого давления или банку полимерную с навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия из полиэтилена низкого давления. На банку наклеивают этикетку из самоклеящегося материала. Банку полимерную вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.
Наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационного удостоверение/производитель: Лок-Бета Фармасьютикалз (И) Пвт. Лтд., Индия. *Юридический адрес:* 324, Корпоративный центр, НирмалЛайф Стайл, L.B.S. Марг, Мулунд (запад), Мумбаи-400080, Индия.	**Наименование юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:** Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед, Индия *Юридический адрес:*324, Корпоративный центр, НирмалЛайф Стайл, L.B.S. Марг, Мулунд (запад), Мумбаи - 400080, Индия.
	Производитель: Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед, Индия

Старая редакция	Новая редакция
	*Юридический адрес:*324, Корпоративный центр, НирмалЛайф Стайл, L.B.S. Марг, Мулунд (запад), Мумбаи - 400080, Индия. *Адрес места производства:* Дж. Дункан ХелфкэаПвт. Лтд. (705500), Участок № 65, 66, 67, Фаза-II, АтгаонИндастриэл Комплекс, Атгаон, Шахапур (Тане)-421601, Тал-Шахапур, Дист: Тане-Зоун 4, Индия или ООО «ФармКонцепт», Россия Юридический адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, ул. Заводская, д. 1б Адрес места производства: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, ул. Заводская, д. 1б
	Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед, Индия *Юридический адрес:*324, Корпоративный центр, НирмалЛайф

Старая редакция	Новая редакция
	Стайл, L.B.S. Марг, Мулунд (запад), Мумбаи - 400080, Индия
Для направления претензий потребителей: Представительство Лок-Бета Фармасьютикалз (И) Пвт. Лтд. 119119, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, к. 2, офис 2137. тел/факс: +7(495) 930-48-51	**Для направления претензий потребителя:** Представительство Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия) Прайвит Лимитед, Индия 119119, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, к. 2, офис 2137, тел/факс: +7(985) 136-51-70

Глава Представительства

Лок-Бета Фармасьютикалз (Индия)

Прайвит Лимитед



Джайант Каушик