

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Целестодерм®-В**крем для наружного применения 0,1 %****Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия**


Изменение № 2

Дата внесения Изменения «__» 03 06 14 201__ г.



Старая редакция	Новая редакция
Состав В 1 г крема содержится: <i>активное вещество:</i> бетаметазона 17-валерат – 1,22 мг (в эквиваленте 1 мг бетаметазона); <i>вспомогательные вещества:</i> парафин белый мягкий – 150,0 мг, цетостеариловый спирт – 72,0 мг, парафин жидкий – 60,0 мг, макрогол-цетостеариловый эфир – 22,5 мг, фосфорная кислота и натрия гидроксид – q.s. (в виде 5 % раствора в количестве, необходимом для установления pH), натрия дигидрофосфата дигидрат – 3,39 мг (соответствует 3,0 мг натрия дигидрофосфата моногидрата), хлоркрезол – 1,0 мг, вода очищенная – q.s. до 1,0 г.	Состав 1 г крема содержит: <i>Активное вещество:</i> бетаметазона 17-валерат – 1,22 мг (в эквиваленте 1 мг бетаметазона). <i>Вспомогательные вещества:</i> парафин белый мягкий – 150,0 мг, цетостеариловый спирт – 72,0 мг, парафин жидкий – 60,0 мг, макрогол-цетостеариловый эфир – 22,5 мг, фосфорная кислота и натрия гидроксид – q.s. (в виде 5% растворов в количестве, необходимом для установления pH), натрия дигидрофосфата дигидрат – 3,39 мг (соответствует 3,0 мг натрия дигидрофосфата моногидрата), хлоркрезол – 1,0 мг, вода очищенная – q.s. до 1,0 г.
Раздел отсутствует.	Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Какого-либо взаимодействия препарата Целестодерм®-В с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует.	Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами Не выявлено какого-либо влияния препарата Целестодерм®-В на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Специалист отдела
по работе с регуляторными органами



Н.В. Корнеева



84983