

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Целестодерм-В®**Бетаметазон****крем для наружного применения 0,1 %****Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия**

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «____» 26 09 19 20__ г.



Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 г крема содержит: активное вещество: бетаметазона 17-валерат – 1,22 мг (в эквиваленте 1 мг бетаметазона); вспомогательные вещества: парафин белый мягкий – 150,0 мг, цетостеариловый спирт – 72,0 мг, парафин жидкий – 60,0 мг, макрогол-цетостеариловый эфир – 22,5 мг, фосфорная кислота и натрия гидроксид – q.s. (в виде 5 % растворов в количестве, необходимом для установления pH), натрия дигидрофосфата дигидрат – 3,39 мг (соответствует 3,0 мг натрия дигидрофосфата моногидрата), хлоркрезол – 1,0 мг, вода очищенная – q.s. до 1,0 г.	Состав 1 г крема содержит: действующее вещество: бетаметазона 17-валерат – 1,22 мг (в эквиваленте 1 мг бетаметазона); вспомогательные вещества: парафин белый мягкий – 150,00 мг, цетостеариловый спирт – 72,00 мг, парафин жидкий – 60,00 мг, макрогол-цетостеариловый эфир – 22,50 мг, фосфорная кислота – q.s. ¹ , натрия гидроксид – q.s. ² , натрия дигидрофосфата дигидрат – 3,39 мг (соответствует 3,0 мг натрия дигидрофосфата моногидрата), хлоркрезол – 1,00 мг, вода очищенная – q.s. ³ до 1,00 г. ¹ соответствует 0,02 мг/г в виде 5 % раствора фосфорной кислоты, допускается корректировка в количестве, необходимом для установления pH в требуемом диапазоне, но обычно не требуется; ² соответствует 0,15-0,45 мкл/г 5 % раствора гидроксида натрия. Используется для регу-

Старая редакция	Новая редакция
	лировки pH. ³ соответствует 689,42-689,72 мг воды на грамм крема.

Менеджер по регистрации



Олейник Е.Ф.



116075