

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Дульколакс®

наименование лекарственного препарата

суппозитории ректальные, 10 мг

лекарственная форма, дозировка

Институт де Ангели С.Р.Л., Италия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 070414 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства Бисакодил – местное слабительное из группы производных дифенилметана с незначительным антирезорбтивным эффектом. После гидролиза в толстом кишечнике бисакодил стимулирует его перистальтику и способствует накоплению воды и электролитов в просвете толстого кишечника. Это приводит к стимуляции дефекации, уменьшению времени эвакуации и размягчению стула. Действие обусловлено прямой стимуляцией нервных окончаний в слизистой оболочке толстого кишечника. Время развития слабительного эффекта препарата составляет 20 мин, в некоторых случаях – 45 мин.	Фармакологические свойства Бисакодил – местное слабительное из группы производных дифенилметана с незначительным антирезорбтивным эффектом. После гидролиза в толстом кишечнике бисакодил стимулирует его перистальтику и способствует накоплению воды и электролитов в просвете толстого кишечника. Это приводит к стимуляции дефекации, уменьшению времени эвакуации и размягчению стула. Действие обусловлено прямой стимуляцией нервных окончаний в слизистой оболочке толстого кишечника. Время развития слабительного эффекта препарата составляет 20 мин, в некоторых случаях – 45 мин.

Старая редакция	Новая редакция
	Бисакодил, являясь слабительным средством, действующим на уровне толстой кишки, стимулирует естественный процесс эвакуации в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Поэтому бисакодил не оказывает влияния на переваривание или всасывание калорийной пищи или незаменимых питательных веществ в тонком кишечнике.
Способ применения и дозы <u>При запорах</u> Взрослые и дети старше 10 лет – по 1 суппозиторию в сутки. Суппозиторий вводится в прямую кишку заостренным концом вперед. Действие наступает примерно через 20 мин (от 10 мин до 30 мин). Не применять препарат ежедневно без консультации врача и установления причины запора более 10 дней. <u>При подготовке к исследованиям, пред- и послеоперационного лечения.</u> При подготовке к исследованиям, пред- и послеоперационного лечения, медицинских состояниях, которые требуют облегчения дефекации, Дульколак должен применяться под медицинским наблюдением. Рекомендуется в комбинации с таблетками для достижения полного опорожнения. В дополнение к 2-4 таблеткам, принятым накануне, рекомендуется один	Способ применения и дозы <u>При запорах</u> Взрослые и дети старше 10 лет – по 1 суппозиторию в сутки. Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозу (10 мг). Суппозиторий вводится в прямую кишку заостренным концом вперед. Действие наступает примерно через 20 мин (от 10 мин до 30 мин). Не применять препарат ежедневно без консультации врача и установления причины запора более 10 дней. <u>При подготовке к исследованиям, пред- и послеоперационного лечения.</u> При подготовке к исследованиям, пред- и послеоперационного лечения, медицинских состояниях, которые требуют облегчения дефекации, Дульколак должен применяться под медицинским наблюдением. Рекомендуется в комбинации с таблетками для достижения полного опорожнения. В

Старая редакция	Новая редакция
суппозиторий утром. Решение о необходимом количестве таблеток Дульколакс для приема накануне исследования/ операции принимает лечащий врач, на основании клинического состояния пациента и объема предстоящей манипуляции.	дополнение к 2-4 таблеткам, принятым накануне, рекомендуется один суппозиторий утром. Решение о необходимом количестве таблеток Дульколакс для приема накануне исследования/ операции принимает лечащий врач, на основании клинического состояния пациента и объема предстоящей манипуляции.

Менеджер по регистрации

