

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по медицинскому применению лекарственного препарата**

**МЕТИЛУРАЦИЛ**



**Регистрационный номер**

**Торговое наименование препарата:** Метилурацил

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Диоксометилтетрагидропиримидин

**Лекарственная форма:** мазь для местного и наружного применения.

**Состав:**

1 г мази содержит:

действующее вещество: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 100 мг;

вспомогательные вещества: вазелин, ланолин, вода очищенная.

**Описание**

Мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** репарации тканей стимулятор

**Код АТХ:** D11AX.

**Фармакологические свойства**

Обладает анаболической и антикатаболической активностью, ускоряет процессы клеточной регенерации.

**Показания к применению**

Вялозаживающие раны, ожоги (термические, химические, лучевые), буллезные дерматиты. Метилурацил может использоваться с профилактической целью для предупреждения реакций кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения радиоэпителиита и поздних сращений стенок (окклюзий) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, избыточность грануляций в ране.

### **С осторожностью**

Беременность и период лактации; детский возраст до 3-х лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение возможно только в том случае, когда ожидаемая польза применения для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Местно.

Мазь наносят на поврежденные участки тонким слоем в количестве 5-20 г ежедневно в течение 15-30 дней. Мазь используется в рыхлых тампонах для лечения радиоэпителиита и поздних лучевых повреждений влагалища.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции в виде зуда, гиперемии и кратковременного жжения.

### **Передозировка**

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных и антисептических средств.

### **Особые указания**

Применение у детей до 3-х лет, при беременности и в период лактации рекомендуется проводить под контролем врача.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами, работу с механизмами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Мазь для местного и наружного применения 10%. По 25 г в тубы алюминиевые или тубы полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года 6 мес. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

### **Производитель/Организация, принимающая претензии**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru



По доверенности АО «Нижфарм»

Е.А. Агафонова