МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
КАСТОРОВОЕ МАСЛО

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 001575-230817
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: касторовое масло.

Международное непатентованное или группировочное наименование: клещевины обыкновенной семян масло.

Лекарственная форма: масло для приема внутрь.

Состав: *действующее вещество:* касторовое масло.

Описание

Прозрачная, густая и вязкая, от бесцветной до желтого цвета жидкость, запах слабый. На воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При охлаждении до - 16 °С застывает в беловатую мазеобразную массу.

Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A06AB05.

Фармакологические свойства

Слабительное средство. При приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление перистальтики. Слабительный эффект наступает обычно через 5 - 6 часов. При приеме касторового масла наблюдается также рефлекторное сокращение мускулатуры матки.

Показания к применению

Запор, подготовка кишечника перед диагностическими процедурами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, «острый» живот, беременность, детский возраст до 12 лет, отравление жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол и др.), лечение глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 15 - 30 г (1 - 2 столовых ложки) один раз в день. Детям от 12 до 18 лет препарат назначается врачом - по 10 - 15 г (1 десертная - 1 столовая ложка) один раз в день. Длительность применения - не более 3 дней.

Если через 3 дня улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном применении - атония кишечника, гипоавитоминозы А и Д.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Развивается при приеме масла касторового в дозе более 7 г/кг массы тела.

Характерные симптомы: диарея, резкие боли спастического характера в животе, нарушение функции почек, головокружение, галлюцинации, потеря сознания. Специфическими антидотами являются атропина сульфат и лоперамид. Меры помощи включают отмену лекарственного средства, восполнение потерь жидкости и электролитов (предпочтительнее комбинированное пероральное и внутривенное введение), симптоматическую терапию, направленную на устранение возникших нарушений. При развитии нейротоксических эффектов вводят диазепам 5 - 10 мг внутривенно.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При одновременном применении снижает абсорбцию жирорастворимых витаминов А, D и К. В дозах до 4 г/сутки увеличивает абсорбцию жирорастворимых лекарств - экстракта мужского папоротника, мебендазола, гризеофульвина, пробукола. Длительное применение касторового масла может привести к развитию гипокалиемии, на фоне которой возможно усиление действия сердечных гликозидов и снижение эффективности антиаритмических средств. Совместное применение касторового масла с диуретиками, глюкокортикостероидами и препаратами корня солодки может увеличить потерю калия. При одновременном применении с солевыми слабительными возможно резкое усиление слабительного эффекта. М-холиноблокирующие средства (атропина сульфат, платифиллин, пирензепин), спазмолитические средства (папаверин, дротаверин), антигистаминные препараты ослабляют действие касторового масла.

Антихолинэстеразные средства (неостигмин, пиридостигмин, ривастигмин) и глицерин усиливают слабительное действие касторового масла. Касторовое масло усиливает действие средств, стимулирующих сократительную активность миометрия (метилэргометрина, эргометрина, окситоцина, простагландинов) вплоть до возникновения угрозы разрыва матки при родах.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением Касторового масла проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат не следует применять более 3-х дней; в случае отсутствия эффекта рекомендуется обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Масло для приема внутрь.

По 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, или в банки оранжевого стекла, или по 100 мл во флаконы оранжевого стекла, или по 50 и 100 мл во флаконы полимерные.

По 250 мл во флаконы стеклянные.

Каждый флакон, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается укладка флаконов, банок, в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению. На флаконы, банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеющуюся этикетку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ОАО «Самарамедпром», 443070, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Производитель

ОАО «Самарамедпром», 446100, РФ, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 99-Б.

ОАО «Самарамедпром», 443546, РФ, Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра-Дубрава, на территории завода «Коммунар», лит. Б, Б1, здание №2.

Генеральный директор
ОАО «Самарамедпром» Найденов К.А.