

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата**Клиндовит**
гель для наружного применения 1 %Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН"
(АО "АКРИХИН"), Россия

Изменение № 5

Дата внесения изменения " ____ " _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 100 г геля содержат: <i>действующее вещество:</i> клиндами- цина фосфат – 1,188 г, что эквива- лентно 1 г клиндамицина; <i>вспомогательные вещества:</i> метилпа- рагидроксибензоат (нипагин), аллан- тоин, динатрия лауриминодипропио- ната токоферила фосфат, пропи- ленгликоль, макрогол-400 (полиэтиле- ноксид-400), карбомер сополимер, карбомер интерполимер, натрия гид- роксид, вода очищенная.	Состав 100 г геля содержат: <i>действующее вещество:</i> клиндами- цина фосфат – 1,188 г, что эквива- лентно 1 г клиндамицина; <i>вспомогательные вещества:</i> метилпа- рагидроксибензоат (нипагин), аллан- тоин, пропиленгликоль, макрогол-400 (полиэтиленоксид-400), карбомер со- полимер, карбомер интерполимер, натрия гидроксид, вода очищенная.
Форма выпуска Гель для наружного применения 1 %. По 30 г в тубе алюминиевой. Каждая	Форма выпуска Гель для наружного применения 1 %. По 30 г в тубе алюминиевой с

туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

бушонами из полимерных материалов. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Представитель фирмы



Е.В. Новикова