

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Аквадетрим®

капли для приема внутрь, 15 000 МЕ/мл

Медана Фарма Акционерное Общество, Польша

Изменение № 5

270618

Дата внесения Изменения «____» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<i>Беременность и период лактации</i> В период беременности не следует применять витамин D₃ в высоких дозах из-за возможности проявления тератогенного действия в случае передозировки. С осторожностью следует назначать витамин D₃ у женщин, кормящих ребенка грудью – препарат, принимаемый в высоких дозах матерью, может вызвать симптомы передозировки у ребенка. В период беременности и грудного вскармливания доза витамина D₃ не должна превышать 600 МЕ в сутки.	<i>Беременность и период лактации</i> В период беременности не следует применять витамин D₃ в высоких дозах из-за возможности проявления тератогенного действия в случае передозировки. С осторожностью следует назначать витамин D₃ у женщин, кормящих ребенка грудью – препарат, принимаемый в высоких дозах матерью, может вызвать симптомы передозировки у ребенка.
Особые указания Избегать передозировки. Индивидуальное обеспечение определенной потребности должно	Особые указания Избегать передозировки. Индивидуальное обеспечение определенной потребности должно

Старая редакция	Новая редакция
учитывать все возможные источники этого витамина. Слишком высокие дозы витамина D₃, применяемые продолжительно или ударные дозы, могут быть причиной хронического гипервитаминоза D₃. Определение суточной потребности ребенка в витамине D и способа его применения должны устанавливаться врачом индивидуально и каждый раз подвергаться коррекции во время периодических обследований, особенно в первые месяцы жизни. Не применять одновременно с витамином D₃ высоких доз кальция. Во время лечения необходим периодический контроль концентрации фосфатов в крови и моче. При длительном приеме колекальциферола необходимо регулярно определять уровень кальция в сыворотке крови и моче, а также оценивать функцию почек путем измерения сывороточного уровня креатинина. При необходимости, следует корректировать дозу колекальциферола в зависимости от уровня кальция в сыворотке крови.	учитывать все возможные источники этого витамина. Слишком высокие дозы витамина D₃, применяемые продолжительно или ударные дозы, могут быть причиной хронического гипервитаминоза D₃. Определение суточной потребности ребенка в витамине D и способа его применения должны устанавливаться врачом индивидуально и каждый раз подвергаться коррекции во время периодических обследований, особенно в первые месяцы жизни. При достижении адекватного уровня концентрации витамина D в крови (>30 нг/мл 25(OH)D) у взрослых возможно продолжение поддерживающей терапии препаратом Аквадетрим® в дозе 1500 – 2000 МЕ (3-4 капли) в сутки. Не применять одновременно с витамином D₃ высоких доз кальция. Во время лечения необходим периодический контроль концентрации фосфатов в крови и моче. При длительном приеме колекальциферола необходимо регулярно определять уровень кальция в сыворотке крови и моче, а также оценивать функцию почек путем измерения сывороточного уровня креатинина. При необходимости, следует корректировать дозу колекальциферола в зависимости от уровня кальция в сыворотке крови.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	Условия хранения Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в местах, недоступных для детей.

Представитель компании



В.В. Вербилович