МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-002522/07-150321
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СНУП®

спрей назальный дозированный 45 мкг/доза и 90 мкг/доза

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ, Германия

Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У., Испания

Хемомонт д.о.о., Черногория

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 150321 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 доза спрея (90 мкл) содержит: *действующее вещество*: ксилометазолина гидрохлорид – 45 мкг или 90 мкг; *вспомогательные вещества*: морская вода, калия дигидрофосфат, вода очищенная.	**Состав** 1 доза спрея (90 мкл) содержит: *действующее вещество*: ксилометазолина гидрохлорид – 45 мкг или 90 мкг; *вспомогательные вещества*: морская вода, калия дигидрофосфат, вода для инъекций.
Показания к применению Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой носоглотки). Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.	**Показания к применению** Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.
Способ применения и дозы Интраназально.	**Способ применения и дозы** Интраназально.

Снуп® спрей назальный дозированный 45 мкг/доза *Детям в возрасте с 2-х до 5 лет* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки. *Взрослым и детям старше 6 лет* по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Не следует применять более 3 раз в сутки. **Снуп® спрей назальный дозированный 90 мкг/доза** *Взрослым и детям старше 6 лет* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Не следует применять более 3 раз в сутки. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. Рекомендуется последнее впрыскивание проводить непосредственно перед сном. Перед применением необходимо очистить носовые ходы. Рисунок 1.  Снять защитный колпачок. Перед первым применением несколько раз нажать на ободок распылительной насадки (рис. 1) до появления равномерного облачка «тумана». Флакон с препаратом готов к дальнейшему использованию. Рисунок 2.	**Снуп® спрей назальный дозированный 45 мкг/доза** *Детям в возрасте с 2-х до 6 лет* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки. *Взрослым и детям старше 6 лет* по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Не следует применять более 3 раз в сутки. **Снуп® спрей назальный дозированный 90 мкг/доза** *Взрослым и детям старше 6 лет* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Не следует применять более 3 раз в сутки. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. Рекомендуется последнее впрыскивание проводить непосредственно перед сном. Перед применением необходимо очистить носовые ходы. Рисунок 1.  Снять защитный колпачок. Перед первым применением несколько раз нажать на ободок распылительной насадки (рис. 1) до появления равномерного облачка «тумана». Флакон с препаратом готов к дальнейшему использованию. Рисунок 2.

 При применении насадку ввести в полость носа и нажать один раз (рис. 2) на ободок. Флакон держать вертикально. Не распылять горизонтально или вниз. Непосредственно после впрыска рекомендуется произвести лёгкий вдох носом. После использования закрыть флакон защитным колпачком. Каждый флакон должен использоваться индивидуально. После завершения терапии препарат можно назначать повторно только через несколько дней. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.	 При применении насадку ввести в полость носа и нажать один раз (рис. 2) на ободок. Флакон держать вертикально. Не распылять горизонтально или вниз. Непосредственно после впрыска рекомендуется произвести лёгкий вдох носом. После использования закрыть флакон защитным колпачком. Каждый флакон должен использоваться индивидуально. После завершения терапии препарат можно назначать повторно только через несколько дней. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

По доверенности АО «Нижфарм» Е.А. Агафонова