

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Ксизал®

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг

ЮСБ Фаршим С.А., Швейцария

Изменение № 1

210621

Дата внесения Изменения « » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка содержит: <i>Ядро: активное вещество:</i> левоцетиризина дигидрохлорид 5,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат 63,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая 30,00 мг, кремния диоксид коллоидный 0,50 мг, магния стеарат 1,00 мг. <i>Оболочка:</i> опадрай Y-1-7000 3,00 мг (содержит гипромеллозу 62,5 %, титана диоксид (E171) 31,25 %, макрогол 400 6,25 %).	Состав 1 таблетка содержит: <i>Действующее вещество:</i> левоцетиризина дигидрохлорид 5,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат 63,50 мг, целлюлоза микрокристаллическая (Авицел РН-102) 30,00 мг, кремния диоксид коллоидный 0,50 мг, магния стеарат 1,00 мг. <i>Оболочка пленочная:</i> опадрай Y-1-7000 3,0 мг (содержит гипромеллозу 62,5 %, титана диоксид (E171) 31,25 %, макрогол 400 6,25 %).
Описание Овальной формы таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На одной стороне таблетки выдавлена маркировка «Y».	Описание Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от белого до почти белого цвета с логотипом «Y» на одной стороне.
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг.

Старая редакция	Новая редакция
По 7 или 10 таблеток в блистере из ПВХ – алюминиевой фольги. 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.	По 7 или 10 таблеток в блистере из ПВХ/алюминиевая фольга. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. Картонная пачка имеет систему контроля первого вскрытия.

Менеджер по регистрации



Тюрин Н.Е.