

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЛИДОКАИН

Регистрационный номер:

Торговое название: Лидокаин

Международное непатентованное название: лидокаин (lidocainum)

Химическое название: 2-диэтиламино-2', 6'-ацетксилидина гидрохлорид моногидрат.

Лекарственная форма: глазные капли

Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Состав:

1 мл раствора содержит:

Активное вещество: лидокаина гидрохлорид в пересчете на безводное вещество - 20 мг;

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, бензетония хлорид, вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа: местноанестезирующее средство.

Код АТХ: S01HA07.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Лидокаин по химической структуре относится к производным ацетанилида и обладает выраженным местноанестезирующим свойством. Местноанестезирующее действие обусловлено угнетением нервной проводимости за счет блокады натриевых каналов в нервных окончаниях и нервных волокнах. Анестезирующий

эффект лидокаина развивается через 5 - 10 минут после инстилляций в конъюнктивальный мешок, длительность действия 60 - 120 минут.

Фармакокинетика

Величина максимальной концентрации (C_{max}) лидокаина в плазме крови – 1,5 - 5 мкг/мл; период полувыведения ($T_{1/2}$) – 1,6 ч. Метаболизируется в печени микросомальной оксидазой путем дезалкилирования в моноэтилглицин и ксилид. Последний обладает анестетическим и токсическим свойствами. Приблизительно 75 % ксилида выводится с мочой. При метаболизме лидокаина не образуется пара-аминобензойная кислота, благодаря чему он не обладает антисульфаниламидным действием.

Показания к применению

Используется для обезболивания перед проведением:

- измерения внутриглазного давления (тонометрия);
- гониоскопии;
- диагностического соскоба конъюнктивы;
- кратковременных оперативных вмешательств на роговице и конъюнктиве (в т.ч. извлечения инородных тел и швов из роговицы и конъюнктивы);
- при подготовке к офтальмологическим операциям.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью

Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В период беременности и кормления грудью препарат следует применять только в случае, когда польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 – 2 капли (но не более 2 – 3 капель) перед исследованием или оперативным вмешательством.

Побочное действие

Местные реакции: ощущение легкого жжения, которое исчезает по мере развития анестезирующего эффекта; аллергические реакции: редко — кожная сыпь, зуд; гиперемия слизистых оболочек.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата лидокаин (при закапывании в конъюнктивальный мешок) не сообщалось.

При передозировке отменить введение лидокаина.

Взаимодействие с другими лекарствами

Норэпинефрин и другие местные альфа-адреномиметики за счет сужения сосудов снижают всасывание лидокаина в системный кровоток, пролонгируют и усиливают его действие.

Форма выпуска

Капли глазные 2 %.

1,3 мл, 1,5 мл, 2 мл или 5 мл в тубик-капельницы полимерные. 1, 2, 5, 10 тубик-капельниц с инструкцией по применению препарата и инструкцией по применению тубик-капельницы в пачку из картона с перегородками или без перегородок.

5 мл или 10 мл во флакон-капельницы полимерные. 1, 2 флакон-капельницы с инструкцией по применению препарата и инструкцией по применению флакон-капельницы в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения

2 года. После вскрытия тубик-капельницы или флакон-капельницы — 1 месяц.

Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»,
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, 25. Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10.


Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

Директор

ФГУП «Московский эндокринный завод»



В.Ф. Руденко



5 4 4 4 3