МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003246-310320
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Муравьиный спирт

Регистрационный номер

Торговое наименование

Муравьиный спирт

Международное непатентованное или группировочное наименование

Муравьиная кислота

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 мл:

Кислота Муравьиная – 1,4 г.

Этанол (спирт этиловый) 70% – 98,6 г.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с резким характерным запахом

Код АТХ: [M02AX10]

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство.

Фармакологические свойства

Местнораздражающее средство, оказывает «отвлекающее» действие. Возбуждает чувствительные рецепторы кожи, вызывает расширение сосудов, улучшает трофику тканей.

Показания к применению

Невралгия, миалгия, артралгия, неспецифические моно- и полиартриты

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема). Беременность, период лактации, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и лактации противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно, для растирания кожи в болезненной области. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс можно повторять.

Побочные действия

Аллергические реакции; гиперемия, ощущение жжения в месте нанесения препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу****.*

Передозировка

Сведения о симптомах передозировки при местном и наружном применении препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нет сведений.

Особые указания

Не наносить на слизистые оболочки. Данные о влиянии препарата на организм пациентов при беременности и лактации отсутствуют. Эффективность и безопасность препарата у пациентов 18 лет не установлена.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы,

обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Нет сведений.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой 1,4 %.

По 25, 40, 50, 100 мл во флаконы или флаконы-капельницы из стекла, укупоренные пробками-капельницами в комплекте с крышкой навинчиваемой, или пробками в комплекте с крышкой навинчиваемой, или пробками-капельницами в комплекте с крышкой.

По 25, 40, 50, 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками.

Каждый флакон по 25, 40, 50, 100 мл вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона. Допускается нанесение текста инструкции по применению на пачку. Допускается упаковка флаконов от 2 до 120 с равным количеством инструкций по применению лекарственного препарата в ящик из гофрированного картона или коробку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

АО «РФК», Россия, Орловская обл., Краснозоренский р-он, пос. Ключики.

Тел./факс: (495) 649-92-61

Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии

АО «САЛЮД», Россия

123022, г. Москва, Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15 эт. 5 пом. 11 ком 1.

тел +7(985)992-45-93, e-mail: saludao@mail.ru

Генеральный директор

АО «САЛЮД» А.В. Наумов