

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Пимафуцин®**

наименование лекарственного препарата

**Торговое наименование:** Пимафуцин®

**Международное непатентованное наименование:** Натамицин

**Лекарственная форма:** таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

**Состав:**

1 таблетка содержит:

*Активное вещество:* натамицин 100,0 мг;

*вспомогательные вещества:* крахмал картофельный 79,2 мг, повидон К30 5,0 мг, магния стеарат 2,5 мг, лактозы моногидрат 66 мг;

*оболочка:* целлацефат 18 мг, триацетин 2,7 мг, сахароза 122 мг, метилпарагидроксибензоат 0,07 мг, кальция карбонат 30 мг, каолин 14,2 мг, тальк 21,7 мг, титана диоксид 3 мг, акации камедь 7,3 мг, желатин 3,3 мг, воск пчелиный белый 0,13 мг.

**Описание**

Круглые таблетки белого или почти белого цвета, покрытые оболочкой.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогрибковое средство.

**Код АТХ:** A07AA03

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Противогрибковый полиеновый (тетраеновый) антибиотик группы макролидов. Оказывает преимущественно фунгицидный эффект. Натамицин необратимо связывается с эргостерином клеточной мембраны клетки гриба, что ведет к нарушению ее целостности, потере содержимого цитоплазмы и гибели клетки. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжевых и плесневых грибов, включая роды *Candida*, *Aspergillus*, *Cephalosporium*, *Fusarium* и *Penicillium*. Менее чувствительны к натамицину дерматофиты и *P. boydii*. Случаев резистентности к натамицину в клинической практике не отмечено. Натамицин в лекарственной форме таблетки кишечнорастворимые действует только в просвете кишечника.

### Фармакокинетика

Натамицин не всасывается из желудочно-кишечного тракта и не оказывает системного действия.

### Показания к применению

- кандидоз кишечника;
- острый псевдомембранозный и острый атрофический кандидоз у пациентов с кахексией, иммунной недостаточностью, а также после терапии антибиотиками, кортикостероидами, цитостатиками;
- санация кишечного резервуара грибов рода *Candida* при кандидозе кожи и слизистых оболочек, в т.ч. при кандидозных вагинитах, вульвитах, вульвовагинитах.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Режим дозирования и способ введения

Внутрь. Прием пищи не оказывает влияния на эффективность препарата.

При кандидозе кишечника взрослым рекомендуется принимать 1 таблетку 4 раза в сутки, детям - 1 таблетку 2 раза в сутки. Средняя продолжительность курса лечения - 1 неделя.

При упорном течении вагинитов, вызванных грибами рода *Candida*, совместно с местными противогрибковыми препаратами (например, суппозиториями Пимафуцин®) для санации

очага кандидозной инфекции в кишечнике применяют таблетки Пимафуцин® (внутрь по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение 10-20 дней).

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.

#### **Меры предосторожности при применении**

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, фруктозы, дефицитом лактазы Лаппа, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозно-изомальтазной недостаточностью необходимо принимать во внимание, что препарат содержит лактозы моногидрат (66 мг) и сахарозу (122 мг).

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата Пимафуцин® обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Пимафуцин® в данной лекарственной форме не рекомендуется для применения у детей грудного возраста ввиду возможного затруднения при проглатывании таблеток.

#### **Передозировка препарата**

О случаях передозировки препарата Пимафуцин® не сообщалось.

#### **Побочное действие**

Со стороны пищеварительной системы: возможны тошнота и диарея, возникающие в первые дни приема таблеток и проходящие самостоятельно в ходе лечения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействие препарата Пимафуцин® с другими лекарственными препаратами не обнаружено.

#### **Беременность и период лактации**

Применение препарата Пимафуцин® при беременности и в период лактации возможно.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Пимафуцин® не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

**Форма выпуска**

Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг.

По 20 таблеток во флакон из коричневого стекла, закрывающийся металлической навинчивающейся крышкой.

По 1 флакону в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

**Срок годности**

4 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах недоступных для детей.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель****Производитель/Владелец регистрационного удостоверения**

«Астеллас Фарма Юроп Б.В.», Нидерланды/

Astellas Pharma Europe B.V., Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, the Netherlands

**Упаковщик:**

«Астеллас Фарма Юроп Б.В.», Нидерланды или ЗАО «ОРТАТ», Россия

**Выпускающий контроль качества:**

«Астеллас Фарма Юроп Б.В.», Нидерланды или ЗАО «ОРТАТ», Россия

**Претензии потребителей направлять по адресу:**

Московское представительство «Астеллас Фарма Юроп Б.В.», Нидерланды:

Россия, 109147, Москва, ул. Марксистская, 16

Телефон: +7 (495) 737-07-55; факс: +7 (495) 737-07-57

Менеджер по регистрации



Т.В. Синюкова