МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003053-171016
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Микодерил
крем для наружного применения, 1 %

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 171016 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения Микодерил	ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения Микодерил®
Торговое название: Микодерил **Международное непатентованное название:** нафтифин	**Торговое наименование препарата:** Микодерил® **Международное непатентованное наименование:** нафтифин
Способ применения и дозы Наружно. ***При поражении кожи*** Микодерил наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки, после тщательной очистки и высушивания (захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения). Длительность терапии при дерматомикозах – 2–4 недели (при необходимости – до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. ***При поражении ногтей*** Микодерил наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют	**Способ применения и дозы** Наружно. ***При поражении кожи*** Микодерил® наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки, после тщательной очистки и высушивания (захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения). Длительность терапии при дерматомикозах – 2–4 недели (при необходимости – до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. ***При поражении ногтей*** Микодерил® наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением

Старая редакция	Новая редакция
пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.	препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов.
Особые указания Требуется курсовое лечение. *Меры предосторожности при применении:* препарат Микодерил не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. *Использование в педиатрии:* с осторожностью следует применять препарат у детей до 18 лет (эффективность и безопасность препарата не доказана). ***Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**:* Микодерил не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.	**Особые указания** Требуется курсовое лечение. *Меры предосторожности при применении:* препарат Микодерил® не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. *Использование в педиатрии:* с осторожностью следует применять препарат у детей до 18 лет (эффективность и безопасность препарата не доказана). ***Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**:* Микодерил® не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Производитель ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Юридический адрес: 634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 211, тел./факс (3822) 40-28-56.	**Производитель** *При производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм":* ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" Юридический адрес: 634009, Россия,

Старая редакция	Новая редакция
Адрес производства: 634009, Россия, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 89, тел./факс (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru.	г. Томск, пр. Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56. Адрес производства: 634009, Россия, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 89, тел./факс (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru. *или* *При производстве на ЗАО "ЛЕККО":* ЗАО "ЛЕККО", Россия, 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, тел./факс: (49243) 71 5 52, www.lekko-pharm.ru.

Представитель
ПАО "Отисифарм" Е.В. Толстова