

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

30 05 22

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Оксиметазолин

наименование лекарственного препарата

спрей назальный, 0,025 %, 0,05 %

лекарственная форма, дозировка

ООО "Фирма "ВИПС-МЕД", Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 30 05 22 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
<u>Риноргол Рино</u> наименование лекарственного препарата Торговое наименование: Риноргол Рино	<u>Оксиметазолин</u> наименование лекарственного препарата Торговое наименование: Оксиметазолин

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению - лечение острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком; - аллергический ринит; - вазомоторный ринит; - для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа, евстахиите, среднем отите; - для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.	Показания к применению Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, обострение вазомоторного ринита, для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите, среднем отите, для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Противопоказания - повышенная чувствительность к компонентам препарата; - атрофический ринит; - закрытоугольная глаукома; - хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе); - состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии; - детский возраст до 1 года - для спрея 0,025 %; - детский возраст до 6 лет - для спрея 0,05 %.	Противопоказания Гиперчувствительность к оксиметазолину и другим компонентам препарата, атрофический ринит, закрытоугольная глаукома, хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе), состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии, воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа, детский возраст до 1 года - для спрея 0,025 %, детский возраст до 6 лет - для спрея 0,05 %.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Интраназально. <u>Для детей в возрасте от 1 до 6 лет</u> применяют 0,025 % раствор оксиметазолина по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. <u>Для взрослых и детей старше 6 лет</u> применяют 0,05 % раствор оксиметазолина по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки. Перед применением необходимо очистить носовые ходы. Не рекомендуется применять препарат более 7 дней. При частом и длительном использовании препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу.	Способ применения и дозы Интраназально. Взрослые и дети старше 6 лет – по 1-впрыскиванию 0,05 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. Дети в возрасте от 1 года до 6 лет – по 1 впрыскиванию 0,025 % раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день. Препарат применяется от 3 до 5 дней. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять препарат не более 7 дней. Если симптомы усиливаются или улучшения не наступает в течение 3-х дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Повторный курс препарата возможен только спустя несколько дней, в течение которых препарат не применялся. При частом и длительном применении препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. В этом случае следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Держатель регистрационного	Держатель регистрационного

Старая редакция	Новая редакция
удостоверения / Организация, принимая претензии: Общество с ограниченной ответственностью «Фармактив», Россия 123154, г. Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, 6-й этаж, пом. I, ком. 17. Тел.: +7 (495) 363-69-38.	удостоверения / Организация, принимая претензии: Общество с ограниченной ответственностью «МИКФЕТИН», Россия 123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8, строение 3, этаж 6, Пом. I, Ком. 4. Тел.: +7 (495) 363-69-38.

Генеральный директор
ООО «МИКФЕТИН»



подпись

Баландина И. В.
ФИО