МИНЗДРАВ РОССИИ
№ N014970/01- 080419
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фервекс® для детей,

порошок для приготовления раствора для приема внутрь,

Парацетамол + Фенирамин + [Аскорбиновая кислота]

0,280 г +0,010 г +0,100 г

УПСА САС, Франция

Регистрационное удостоверение П N014970/01

Изменение № 2 080419

Дата внесения изменений « _____» _____ 20_____ г.

Старая редакция	Новая редакция
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ Фервекс® для детей не следует применять одновременно с другими лекарствами, содержащими парацетамол. При применении препарата более недели необходим контроль за функциональным состоянием печени и картиной периферической крови. В случае приема препарата детьми, страдающими сахарным диабетом или находящимися на диете с пониженным содержанием сахара, следует учитывать, что в каждом пакетике содержится 2,4 г сахарозы. Парацетамол искажает результаты лабораторных исследований содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови.	**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ** Фервекс® для детей не следует применять одновременно с другими лекарствами, содержащими парацетамол. При применении препарата более недели необходим контроль за функциональным состоянием печени и картиной периферической крови. Парацетамол искажает результаты лабораторных исследований содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови.

Старая редакция	Новая редакция
При отсутствии терапевтического эффекта (повышение температуры тела сохраняется более 3 дней и болевой синдром более 5 дней) требуется консультация врача.	При отсутствии терапевтического эффекта (повышение температуры тела сохраняется более 3 дней и болевой синдром более 5 дней) требуется консультация врача.

Менеджер отдела регистрации и качества
ООО «Бристол-Майерс Сквибб» Е.В. Скороход

