МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006455/09-291020
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Боботик®
капли для приема внутрь 66,66 мг/мл

МЕДАНА ФАРМА Акционерное общество, Польша

Изменение № 4

Дата внесения изменения «____» 291020 _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Боботик®	***Торговое наименование:*** Боботик
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ***Фармакокинетика*** Симетикон после перорального введения не всасывается из ЖКТ и выводится через кишечник в неизмененном виде.	**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА** ***Фармакокинетика*** Симетикон химически инертен, после приема внутрь не абсорбируется из ЖКТ и действует только в его просвете. Не взаимодействует с микроорганизмами и ферментами и не влияет на процессы пищеварения. Выводится кишечником в неизмененном виде.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ • Усиленное газообразование и накопление газов в ЖКТ (колики, ощущение наполнения в брюшной полости, метеоризм в т. ч. в послеоперационном периоде, синдром Ремгельда, аэрофагия); • Подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (рентгенография, сонография, гастроскопия и	**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ** • симптомы кишечных колик у младенцев; • симптомы избыточного образования и скопления газов в ЖКТ (в т. ч. метеоризм, повышенное газообразование в послеоперационном периоде); • симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией;

дуоденоскопия - профилактика образования пены).	• подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, рентгенография, эзофагогастродуоденоскопия и др.) в т. ч., в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения методом двойного контрастирования; • острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (тензиды), в качестве пеногасителя.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Внутрь, после еды. Перед применением взболтать до получения однородной эмульсии. Для точной дозировки препарата, во время закапывания, флакон следует держать вертикально. Усиленное газообразование и накопление газов в области ЖКТ: • дети от 28 дня жизни до 2 лет по 8 капель (20 мг симетикона) 4 раза в сутки; • дети от 2 до 6 лет по 14 капель (35 мг симетикона) 4 раза в сутки; • дети старше 6 лет и взрослые по 16 капель (40 мг симетикона) 4 раза в сутки. Для более удобного введения препарата, в частности маленьким детям, его можно предварительно смешать с небольшим количеством холодной кипяченой воды, детского питания или негазированной жидкости. После исчезновения симптомов прием	**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ** Внутрь, после еды. В 1 мл препарата содержится приблизительно 27 капель. Перед применением взболтать до получения однородной эмульсии. Для точной дозировки препарата, во время закапывания, флакон следует держать вертикально. Усиленное газообразование и накопление газов в области ЖКТ: • дети от 28 дней жизни до 3 лет по 8 капель (20 мг симетикона) 4 раза в сутки; • дети от 3 до 6 лет по 14 капель (35 мг симетикона) 4 раза в сутки; • дети старше 6 лет и взрослые по 16 капель (40 мг симетикона) 4 раза в сутки. Для более удобного введения препарата, в частности маленьким детям, его можно предварительно смешать с небольшим количеством холодной кипяченой воды, детского питания или негазированной

препарата следует прекратить. Подготовка к диагностическим процедурам: Рентгенографическое исследование ЖКТ За один день до исследования препарат принимают 2 раза в сутки (утром и вечером): • дети от 28 дня жизни до 2 лет - 10 капель (25 мг) • дети от 2 до 6 лет - 16 капель (40 мг) • дети старше 6 лет и взрослые - 20 капель (50 мг) Сонографическое исследование ЖКТ За один день до исследования препарат принимают 2 раза в сутки (утром и вечером) в дозировках, рекомендованных при подготовке к рентгенографическому исследованию. За три часа до начала исследования дозу следует повторить.	жидкости. После исчезновения симптомов прием препарата следует прекратить. Подготовка к диагностическим процедурам: Рентгенографическое исследование ЖКТ За один день до исследования препарат принимают 2 раза в сутки (утром и вечером): • дети от 28 дней жизни до 3 лет по 10 капель (25 мг) • дети от 3 до 6 лет по 16 капель (40 мг) • дети старше 6 лет и взрослые - 20 капель (50 мг) Сонографическое исследование ЖКТ За один день до исследования препарат принимают 2 раза в сутки (утром и вечером) в дозировках, рекомендованных при подготовке к рентгенографическому исследованию. За три часа до начала исследования дозу следует повторить. Острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (тензиды), в качестве пеногасителя: В зависимости от тяжести отравления: **Возраст** / **Доза** Дети / от 1,5 до 6 мл препарата (40-160 капель или до 1/5 содержимого флакона) Взрослые / от 6 до 12 мл препарата (от 1/5 до

	2/5 содержимого флакона).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ Препарат не содержит сахара, возможно применение больными сахарным диабетом и с нарушениями пищеварения. Во время лечения не рекомендуется прием газированных напитков. Прием препарата может исказить результаты некоторых диагностических тестов, например тест с использованием гваяковой смолы.	**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ** Препарат не содержит сахара, возможно применение больными сахарным диабетом и с нарушениями пищеварения. Лекарственный препарат содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, что может вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные). Во время лечения не рекомендуется прием газированных напитков. Прием препарата может исказить результаты некоторых диагностических тестов, например тест с использованием гваяковой смолы.
Срок годности 2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности** 3 года. Вскрытый флакон необходимо использовать в течение 2 месяцев. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Производитель МЕДАНА ФАРМА Акционерное Общество 98-200 Серадз, ул. Польской Организации Войсковой 57, Польша	**Производитель** Медана Фарма Акционерное Общество 98-200 Серадз, ул. Польской Организации Войсковой 57, Польша

Представитель компании Аристархова М.С.