

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СУМАТРИПТАН-АЛИУМ

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг

АО «АЛИУМ», Россия

Изменение № 1

030621

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.



Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество:</i> суматриптана сукцинат 70 мг или 140 мг, в пересчете на суматриптан 50 мг или 100 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, кальция гидрофосфата дигидрат, повидон К90, магния стеарат; <i>состав пленочной оболочки:</i> <i>дозировка 50 мг:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), коповидон (кополивидон), макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), тальк, титана диоксид, краситель пунцовый [Понсо 4R]; <i>дозировка 100 мг:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), коповидон (кополивидон), макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), тальк, титана	Состав 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>действующее вещество:</i> суматриптана сукцинат 70 мг или 140 мг, в пересчете на суматриптан 50 мг или 100 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, натрия кроскармеллоза, кальция гидрофосфата дигидрат, повидон К90, магния стеарат; <i>состав пленочной оболочки:</i> <i>дозировка 50 мг:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), коповидон (кополивидон), макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), тальк, титана диоксид, краситель пунцовый [Понсо 4R]; <i>дозировка 100 мг:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), коповидон (кополивидон), макрогол 6000

131913

Старая редакция	Новая редакция
диоксид.	(полиэтиленгликоль 6000), тальк, титана диоксид.

Директор по регуляторике, исследованиям
и фармаконадзору

Сетдекова Г.У.



Версия 1_0

131913