МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛЕР-007250/08 141020
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Таниз®-К

Tanyz®-K

наименование лекарственного препарата

капсулы с пролонгированным высвобождением, 0,4 мг

лекарственная форма, дозировка

АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 1

141020

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Таниз®-К** **Taniz®-K**	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Таниз®-К** **Tanyz®-K**
Способ применения и дозы *Взрослые пациенты старше 18 лет, пациенты пожилого возраста* Внутрь, после завтрака, запивая водой, принимают по 1 капсуле 1 раз в сутки. Капсулу не рекомендуется разжевывать, так как это может повлиять на скорость высвобождения препарата.	**Способ применения и дозы** *Взрослые пациенты старше 18 лет, пациенты пожилого возраста* Внутрь, после завтрака, запивая водой, принимают по 1 капсуле 1 раз в сутки. Капсулу не рекомендуется разжевывать, так как это может повлиять на скорость высвобождения **препарата.**

рименения и дозы При почечной недостаточности, а также при печеночной недостаточности легкой и средней степени тяжести не требуется коррекции режима дозирования.	При почечной недостаточности, а также при печеночной недостаточности легкой и средней степени тяжести не требуется коррекции режима дозирования.

Руководитель Отдела регистрации Тамкович Т. В.