

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Амиксин®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 125 мг

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « » **121015** 20 г

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку Тилорон - 60 мг или 125 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> крахмал картофельный - 25,500 мг или 46,000 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 60,000 мг или 120,000 мг, повидон-К30 (коллидон 30) - 1,500 мг или 3,000 мг, кальция стеарат - 1,500 мг или 3,000 мг, кроскармеллоза натрия (примеллоза) - 1,500 мг или 3,000 мг; <i>оболочка:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 3,4050 мг или 6,8100 мг, титана диоксид - 1,7815 мг или 3,5630 мг, макрогол-4000 (полиэтиленгликоль-4000) - 0,4565 мг или 0,9130 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,0570 мг или 0,1140 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,1235 мг или 0,2470 мг, краситель солнечный закат желтый (Е 110) - 0,1765 мг или 0,3530 мг.	Состав на одну таблетку Тилорон – 60,0 мг или 125,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>ядро:</i> крахмал картофельный - 25,500 мг или 46,000 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 60,000 мг или 120,000 мг, повидон (повидон К30) - 1,500 мг или 3,000 мг, кальция стеарат - 1,500 мг или 3,000 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 1,500 мг или 3,000 мг; <i>оболочка:</i> гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 3,4050 мг или 6,8100 мг, титана диоксид - 1,7815 мг или 3,5630 мг, макрогол (полиэтиленгликоль-4000) - 0,4565 мг или 0,9130 мг, полисорбат-80 (твин-80) - 0,0570 мг или 0,1140 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,1235 мг или 0,2470 мг, краситель солнечный закат желтый (Е 110) - 0,1765 мг или 0,3530 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг, 125 мг. По 6 или 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 6, 10 или 20 таблеток в банке полимерной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки или 1 банку полимерную вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.	Форма выпуска <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия:</i> Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 125 мг. По 6 или 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 6, 10 или 20 таблеток в банке полимерной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки или 1 банка полимерная вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия:</i> Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 125 мг. По 6 или 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.
Условия отпуска из аптек Без рецепта - таблетки 125 мг, покрытые пленочной оболочкой. По рецепту - таблетки 60 мг, покрытые пленочной оболочкой.	Условия отпуска Без рецепта - таблетки 125 мг, покрытые пленочной оболочкой. По рецепту - таблетки 60 мг, покрытые пленочной оболочкой.
Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии потребителей ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru	Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии: <i>При производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм":</i> ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", 634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина,

Старая редакция	Новая редакция
	д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru или При производстве на ОАО "Фармстан- дарт-Лексредства": ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегат- ная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru

Представитель
ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"



Е.В. Толстова