

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Амиксин®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 125 мг

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «___» 30 06 16 20__ г

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению <u>У детей, старше 7 лет:</u> - для лечения гриппа и других ОРВИ. <u>У взрослых (старше 18 лет):</u> - лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ; - лечение вирусных гепатитов А, В и С; - лечение герпетической и цитомегаловирусной инфекции; - в составе комплексной терапии инфекционно-аллергических и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и др.); - в составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза; - в комплексной терапии туберкулеза легких.	Показания к применению В составе комплексной терапии: <u>У детей от 7 до 18 лет:</u> - лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). <u>У взрослых:</u> - лечение гриппа и других ОРВИ; - лечение герпетической инфекции. Профилактика гриппа и других ОРВИ у взрослых.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к препарату. Период беременности и лактации. Детский возраст до 7 лет. Способ применения и дозы Амиксин принимают внутрь, после еды. <u>Для детей, старше 7 лет:</u> При неосложненных формах гриппа и других ОРВИ - по 60 мг 1 раз в день на 1-й, 2-й и 4-й день от начала лечения. Курсовая доза - 180 мг (3 таблетки). При возникновении осложнений гриппа или других ОРВИ - по 60 мг 1 раз в день на 1-й, 2-й, 4-й и 6-й день от начала лечения. Курсовая доза - 240 мг (4 таблетки). <u>Для взрослых (старше 18 лет):</u> Для лечения гриппа и других ОРВИ - по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения, затем по 125 мг через 48 часов. На курс - 750 мг (6 таблеток). Для профилактики гриппа и других ОРВИ - по 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель. На курс - 750 мг (6 таблеток). Для лечения герпетической, цитомегаловирусной инфекции - первые двое суток по 125 мг, затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза - 1,25-2,5 г (10-20 таблеток). Для неспецифической профилактики вирусного гепатита А - 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель.	Противопоказания Повышенная чувствительность к тилорону или любому другому компоненту препарата. Беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 7 лет (для дозировки 60 мг), детский возраст до 18 лет (для дозировки 125 мг). Способ применения и дозы Амиксин принимают внутрь, после еды. <u>Для детей от 7 до 18 лет:</u> При неосложненных формах гриппа и других ОРВИ - по 60 мг 1 раз в день на 1-й, 2-й и 4-й день от начала лечения. Курсовая доза - 180 мг (3 таблетки). <u>Для взрослых:</u> Для лечения гриппа и других ОРВИ - по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения, затем по 125 мг через 48 часов. На курс - 750 мг (6 таблеток). Для профилактики гриппа и других ОРВИ - по 125 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель. На курс - 750 мг (6 таблеток). Для лечения герпетической инфекции - первые двое суток по 125 мг, затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза - 1,25-2,5 г (10-20 таблеток). При лечении гриппа и других ОРВИ в случае сохранения симптомов заболевания более 4-х дней следует проконсультироваться у врача.

Старая редакция	Новая редакция
Для лечения вирусного гепатита А - в первые сутки по 125 мг 2 раза, затем по 125 мг через 48 ч. На курс - 1,25 г (10 таблеток). Для лечения острого гепатита В - первые два дня по 125 мг, затем 125 мг через 48 часов, на курс лечения - 2 г (16 таблеток). При затяжном течении гепатита В - по 125 мг 2 раза в сутки в первый день, затем по 125 мг через 48 часов. На курс лечения - 2,5 г (20 таблеток). При хроническом гепатите В - начальная фаза лечения (2,5 г - 20 таблеток) - первые два дня по 125 мг 2 раза в день, затем 125 мг через 48 часов. Фаза продолжения (от 1,25 г - 10 таблеток до 2,5 г - 20 таблеток) - по 125 мг в неделю. Курсовая доза Амиксина® от 3,75 г до 5 г, длительность терапии 3,5-6 месяцев в зависимости от результатов биохимических, иммунологических, морфологических исследований, отражающих степень активности процесса. При остром гепатите С - по 125 мг в сутки первые 2 дня лечения, затем по 125 мг через 48 часов. Курс лечения - 2,5 г (20 таблеток). При хроническом гепатите С - начальная фаза лечения (2,5 г - 20 таблеток) - первые два дня по 125 мг 2 раза в день, затем 125 мг через 48 часов. Фаза продолжения (2,5 г - 20 таблеток) - по 125 мг в неделю. Курсовая доза Амиксина® - 5 г, длительность терапии - 6 месяцев в зависимости от результатов биохимических, иммунологических, морфологических маркеров активности процесса.	

Старая редакция	Новая редакция
При комплексной терапии нейровирусных инфекций - по 125-250 мг в сутки первые 2 дня лечения, затем по 125 мг через 48 часов. Дозу устанавливают индивидуально, курс лечения 3-4 недели. При урогенитальном и респираторном хламидиозе - первые двое суток по 125 мг, затем через 48 часов по 125 мг. Курсовая доза - 1,25 г (10 таблеток). При комплексной терапии туберкулёза легких - по 250 мг первые двое суток лечения, далее по 125 мг через 48 часов. Курсовая доза - 2,5 г (20 таблеток).	
Побочное действие Возможны аллергические реакции, диспепсические явления, кратковременный озноб.	Побочное действие Возможны аллергические реакции, диспепсические явления, кратковременный озноб. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Условия отпуска Без рецепта – таблетки 125 мг, покрытые пленочной оболочкой. По рецепту – таблетки 60 мг, покрытые пленочной оболочкой.	Условия отпуска Без рецепта.

Представитель

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"



Е.В. Толстова