

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Триакорт®

мазь для наружного применения 0,1 %

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 130918 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей независимо от возраста. Для профилактики местных инфекционных осложнений возможно применение в сочетании с противомикробными лекарственными средствами.	Особые указания При возникновении побочных эффектов следует прекратить применение препарата. Как и другие местные глюкокортикостероиды, препарат нельзя наносить на кожу в области глаз, а также на раневые поверхности. При применении окклюзионных повязок и использовании на больших поверхностях тела возможно системное действие препарата – в таких случаях требуется повышенная осторожность, особенно при лечении детей. Если течение заболевания осложнено развитием вторичной бактериальной или грибковой инфекции, к терапии препаратом необходимо добавить специфическое антибактериальное или противогрибковое средство. С особой осторожностью следует применять препарат на коже лица. Применение у детей должно проходить с осторожностью. Необходимо учитывать, что у маленьких детей кожные складки и пеленки могут оказывать действие, сходное с окклюзионной повязкой, и повысить системную резорбцию

Старая редакция	Новая редакция
	препарата. Кроме того, у детей возможна большая степень системной резорбции из-за соотношения между поверхностью кожных покровов и массой тела, а также в связи с недостаточной зрелостью кожи. Продолжительность лечения у детей не должна превышать 5 дней. Более длительное применение препарата должно проводиться под контролем врача. Применение окклюзионной повязки детям не рекомендуется.
Условия хранения При температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 15 °С. Допускается краткосрочное хранение препарата при температуре не выше 25 °С в течение 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Представитель фирмы



Д.В. Гайдаренко