

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фенилэфрин-оптик

капли глазные, 2,5 %

Закрытое акционерное общество


"Фармацевтическая фирма "ЛЕККО" (ЗАО "ЛЕККО"), Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

040820

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Местно. При иридоциклитах препарат применяется для предотвращения развития и разрыва уже образовавшихся задних синехий; для снижения экссудации в переднюю камеру глаза. С этой целью 1 капля препарата закапывается в конъюнктивальный мешок больного глаза (глаз) 2-3 раза в сутки. При проведении офтальмоскопии применяется однократная инстилляционная препарата. Как правило, для создания мидриаза достаточно инстилляционной 1 капли препарата в конъюнктивальный мешок. Максимальный мидриаз достигается через 15-30 мин и сохраняется в течение 1-3 ч. В случае необходимости поддержания мидриаза в течение длительного времени, через	Способ применения и дозы Местно. <i>При иридоциклитах</i> препарат применяется для предотвращения развития и разрыва уже образовавшихся задних синехий; для снижения экссудации в переднюю камеру глаза. С этой целью 1 капля препарата закапывается в конъюнктивальный мешок больного глаза (глаз) 2-3 раза в сутки. <i>При проведении офтальмоскопии</i> применяется однократная инстилляционная препарата. Как правило, для создания мидриаза достаточно инстилляционной 1 капли препарата в конъюнктивальный мешок. Максимальный мидриаз достигается через 15-30 мин и сохраняется в течение 1-3 ч. В случае необходимости поддержания мидриаза в течение длительного времени, через

Старая редакция	Новая редакция
1 ч возможна повторная инстилляція препарата. Для проведения диагностических процедур однократная инстилляція препарата применяется: - в качестве провокационного теста у пациентов с узким профилем угла передней камеры глаза и подозрением на закрытоугольную глаукому. Если разница между значениями внутриглазного давления до закапывания препарата и после расширения зрачка составляет от 3 до 5 мм рт. ст., то провокационный тест считается положительным; - для дифференциальной диагностики типа инъекции глазного яблока: если через 5 минут после инстилляції препарата отмечается сужение сосудов глазного яблока, то инъекция классифицируется как поверхностная, при сохранении покраснения глаза необходимо тщательно обследовать пациента на наличие иридоциклита или склерита, так как это свидетельствует о расширении более глуболежащих сосудов. Для снятия спазма аккомодации у детей с 6 лет и взрослых препарат инстиллируют по 1 капле в каждый глаз на ночь ежедневно в течение 4-х недель. Форма выпуска. Капли глазные 2,5 %. По 5 мл или 10 мл во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давле-	1 ч возможна повторная инстилляція препарата. <i>Для проведения диагностических процедур</i> однократная инстилляція препарата применяется: - в качестве провокационного теста у пациентов с узким профилем угла передней камеры глаза и подозрением на закрытоугольную глаукому. Если разница между значениями внутриглазного давления до закапывания препарата и после расширения зрачка составляет от 3 до 5 мм рт. ст., то провокационный тест считается положительным; - для дифференциальной диагностики типа инъекции глазного яблока: если через 5 минут после инстилляції препарата отмечается сужение сосудов глазного яблока, то инъекция классифицируется как поверхностная, при сохранении покраснения глаза необходимо тщательно обследовать пациента на наличие иридоциклита или склерита, так как это свидетельствует о расширении более глуболежащих сосудов. <i>Для снятия спазма аккомодации у детей с 6 лет и взрослых</i> препарат инстиллируют по 1 капле в каждый глаз на ночь ежедневно в течение 4-х недель. <u>Порядок работы с тубик-капельницей:</u> 

Старая редакция	Новая редакция
ния с винтовой горловиной, пробкой-капельницей из полиэтилена низкого давления и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия из полиэтилена низкого давления или во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления с винтовой горловиной, насадкой-дозатором из полиэтилена высокого давления и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия из полипропилена, или во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления с винтовой горловиной, насадкой-дозатором из полиэтилена высокого давления и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия из полиэтилена низкого давления. 1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Срок годности 2 года. Вскрытый флакон-капельницу хранить не более 30 суток. Производитель/организация, принимающая претензии потребителей ЗАО «ЛЕККО», Россия 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 277; 601125, Владимирская обл., Петушинский	1. Отделить одну тубик-капельницу. 2. Вскрыть тубик-капельницу (убедившись, что раствор находится в нижней части тубик-капельницы, вращающими движениями повернуть и отделить клапан). 3. Запрокинуть голову назад, указательным пальцем одной руки оттянуть нижнее веко вниз, удерживая тубик-капельницу другой рукой вертикально над глазом наконечником вниз. 4. Закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза. 5. Закрыть тубик-капельницу клапаном. После вскрытия тубик-капельницу можно использовать в течение 30 суток. По истечения этого срока, тубик-капельницу следует выбросить, даже если осталось содержимое. <u>Порядок работы с флакон-капельницей:</u> 1. Повернуть колпачок против часовой стрелки и снять его. 2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакон-капельницы, зафиксировать между большим и указательным пальцами одной руки. 3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакон-капельницы над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз. Слегка надавить на флакон-капельницу и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза.

Старая редакция	Новая редакция
район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 279; тел./факс (49 243) 71 5 52.	Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакон-капельницы с поверхностью глаза и руками. 4. После использования, надеть колпачок на флакон-капельницу и закрыть вращающими движениями по часовой стрелке. После вскрытия флакон-капельницы препарат можно использовать в течение 30 суток. По истечении этого срока, флакон-капельницу следует выбросить. При видимых повреждениях флакон-капельницы и тубик-капельницы применять препарат не следует. Форма выпуска <i>При производстве на ЗАО "ЛЕККО", Россия:</i> Капли глазные, 2,5 %. По 5 мл или 10 мл во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления с винтовой горловиной, пробкой-капельницей из полиэтилена низкого давления и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия из полиэтилена низкого давления или во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления с винтовой горловиной, насадкой-дозатором из полиэтилена высокого давления и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия из полипропилена, или во флаконы-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления с винтовой горловиной, насадкой-дозатором

Старая редакция	Новая редакция
	из полиэтилена высокого давления и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия из полиэтилена низкого давления. На флакон-капельницу наклеивают этикетку самоклеящуюся. 1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. <i>При производстве на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия:</i> Капли глазные, 2,5 %. По 0,5 мл в тубик-капельницу полимерную, изготовленную по технологии «blow-fill-seal» «выдувание-наполнение-герметизация» из гранул полиэтилена низкой плотности марки Purell производства фирмы «LyondellBasell» или полиэтилена высокого давления (низкой плотности). На тубик-капельницу наклеивают этикетку самоклеящуюся. По 2 блока из 5 тубик-капельниц полимерных вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 1 блоку из 5 тубик-капельниц полимерных помещают в пакет из фольгированной пленки. По 2 пакета вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона Срок годности 2 года. Вскрытый флакон-капельницу хранить не более 30 суток.

Старая редакция	Новая редакция
	Вскрытый тубик-капельницу хранить не более 30 суток. Производитель/организация, принимающая претензии потребителей ЗАО "ЛЕККО", Россия 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 277; 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 279; тел./факс (49 243) 71 5 52. Или Производитель/организация, принимающая претензии потребителей ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, телефон/факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Представитель
ЗАО "ЛЕККО"



Е.В. Толстова